





令和6年度水稲調査結果

カルパー コシヒカリ 成熟期

調査日	1	年次		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
	R 6	慣行		5/24	6/2	6/18	7/1		7/7	7/23	8/5		
		全組織		5/24	6/2	6/18	7/1		7/7	7/23	8/5		
	R 5	慣行		5/29	6/7	6/19	7/3		7/10	7/24	8/10	8/30	
	平年値	慣行		5/25	6/7	6/19	7/3		7/12	7/26	8/5	8/30	
草丈 (cm)	2	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
	(農) 是安営農組合			21.8	27.0					77.9		117.0	
茎数 (m当)	3	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
	(農) 是安営農組合			23.0	27.0	77.0					152.0	100.0	100.0
茎数 (m当)	4	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
	(農) 是安営農組合			77	90	257					507	333	333
群落葉色	5	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
	(農) 是安営農組合					4.2	4.4	4.1		4.0	4.1	4.1	



黒字を慣行として平均

今後の管理

調査次回

6	組織名	苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
葉齢	(農)是安営農組合		4.3	7.0	9.8	11.3		12.0		14.0	
	R 6	慣行	4.3	7.0	9.8	11.3		12.0		14.0	
		全組織	4.3	7.0	9.8	11.3		12.0		14.0	
	R 5	慣行	4.8	6.7	8.8	10.3		11.0		12.8	
平年値	慣行	3.6	6.6	8.7	10.3		11.4		13.4		

調査状況等

7	組織名	ローディング	調査主体	慣行	1ヵ月後	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	抜き株	坪刈り	採取日	指摘事項
	(農)是安営農組合	カルパー	生産者	慣行	○	○	○	○	○	○	9/7	直播の抜き株は1m全て

天候

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

5月6月7月8月9月

水管理看板

8	組織名	田干し	深水管理	浅水管理	中干し	間断かん水	飽水管理	湛水管理	間断かん水	収穫前落水
	(農)是安営農組合									

足跡深さ

9	組織名	中干し前	中干し完了	間断かん水時	幼穂形成期
	(農)是安営農組合		1	1	

生育時期

10	組織名	播種日	幼穂形成期	～	出穂期	～	成熟期	
	(農)是安営農組合	5/1	7/8	23	7/31	36	9/5	
	R 6	慣行	5/1	7/8	23	7/31	36	9/5
		全組織	5/1	7/8	23	7/31	36	9/5
	R 5	慣行	5/1	7/11	18	7/29	33	8/31
平年値	慣行	5/1	7/14	20	8/3	40	9/12	


播種状況

11	組織名	播種量	播種深度	m 苗立本数	㎡ 苗立本数	苗立率	
	(農)是安営農組合	2.5	5.3	22.3	74.3	81.8	
	R 6	慣行	2.5	5.3	22.3	74.3	81.8
		全組織	2.5	5.3	22.3	74.3	81.8
	R 5	慣行	15.0	25.4	84.7	81.7	
平年値	慣行	7.2	21.7	72.4	66.7		
目標	なんと	2.5*3.0	10.0	18*24	60*80	50*80	


※ ○ は予想

※ ○ は予想


カルパー	コシヒカリ	成熟期
------	-------	-----

[illegible]

13	組織名		㎡当穗数	1穗粒数	㎡当粒数	登熟歩合	千粒重	理論収量
			本/㎡	粒/穗	百粒/㎡	%	g	kg/10a
	(農) 是安営農組合		333	76	255	86.9	23.1	512
收量構成要素	R 6	慣行	333	76	255	86.9	23.1	512
		全組織	333	76	255	86.9	23.1	512
	R 5	慣行	383	60	232	92.2	22.1	473
	平年値	慣行	373	74	275	82.3	22.8	514
	目標	みんし	360	75	270	84.0	22.5	510




粒厚分布（％）	14	組織名	2.2mm以上	2.2°2.1	2.1°2.0	2.0°1.9	1.9°1.85	1.85°1.8	1.8°1.7	1.7mm以下	合計	1.9mm以上	1.85mm以下	
		(農)是安宮農組合	9.8	40.4	38.3	7.5	2.0	0.7	0.8	0.7	100	96.0	97.9	
		R 6	慣行	9.8	40.4	38.3	7.5	2.0	0.7	0.8	0.7	100	96.0	97.9
			全組織	9.8	40.4	38.3	7.5	2.0	0.7	0.8	0.7	100	96.0	97.9
	R 5	慣行	16.9	52.0	24.6	5.2	0.7	0.3	0.2	0.2	100	98.7	99.3	
		慣行	7.2	33.7	37.2	15.8	2.4	1.2	1.4	1.0	100	94.2	96.3	



黒字を慣行として平均

15	組織名		穂長	第1節間	第2節間	第3節間	第4節間	第5節間	第6節間	合計	葉身長1	葉身長2	葉身長3	倒伏割合(%)					倒伏率
節間長・葉身長等			cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	少	中	多	甚	%	
		(農)是安宮農組合	18.3	35.9	20.7	17.7	11.2	4.4	0.0	89.9									
R 6	慣行	18.3	35.9	20.7	17.7	11.2	4.4	0.0	89.9										
	全組織	18.3	35.9	20.7	17.7	11.2	4.4	0.0	89.9										
R 5	慣行	17.2	34.8	19.1	16.3	11.0	6.0	0.4	87.6	22.7	33.7	43.7							
平年値	慣行	18.3	36.2	20.4	16.2	11.1	4.5	0.1	88.5	25.8	38.2	46.1							



16	組織名		整粒	乳白粒	青未熟	基部	腹白	他未計	発芽粒	胴割粒	奇形粒	茶米	斑点粒	タンパク	粒長	粒幅
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	mm	mm
	(農)是安営農組合		68.5	0.4	0.6	0.6	0.6	27.4	0.0	0.7	0.1	0.5	0.0	5.7	5.22	2.94
R 6	慣行		68.5	0.4	0.6	0.6	0.6	27.4	0.0	0.7	0.1	0.5	0.0	5.7	5.22	2.94
	全組織		68.5	0.4	0.6	0.6	0.6	27.4	0.0	0.7	0.1	0.5	0.0	5.7	5.22	2.94
R 5	慣行		66.4	0.6	0.4	1.3	1.3	23.8	0.0	4.2	0.6	0.8	0.0	5.8	5.18	2.94
	慣行		76.1	2.2	2.5	1.0	0.7	13.5	0.0	1.4	0.1	0.2	0.3	6.2	5.14	3.06