





令和6年度水稻調査結果

移植	コシヒカリ	成熟期
----	-------	-----

1	年次		移植時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
調査日	R 6	慣行	5/13	5/27	6/10	6/19	7/1		7/8	7/23	8/5	9/2
		全組織	5/13	5/27	6/10	6/18	7/1		7/7	7/23	8/5	9/2
	R 5	慣行	5/15	5/27	6/7	6/16	7/3		7/10	7/24	8/10	8/30
		全組織	5/15	5/26	6/6	6/15	7/4		7/9	7/23	8/7	8/30
	平年値	慣行	5/15	5/26	6/6	6/15	7/4		7/9	7/23	8/7	8/30
2	組織名		移植時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
草丈 (cm)	(農) 細木宮農		26.9	30.6					76.0		112.4	
	(農) 野田宮農		15.8									
	(農) 金戸宮農組合		18.1	30.9					68.2		104.1	
	塔尾宮農組合		22.3	28.9					68.3		100.4	
	(農) 打尾宮農		22.0	30.5					70.9			
	(農) りんどう宮農		27.2	33.2					71.4		104.2	
	(農) N S T アグリ		26.6	27.6							106.9	
	(農) 養谷実践組合		18.9	24.8					66.7		101.8	
	(農) 堀越農産		19.1	30.3					67.5		107.6	
	R 6	慣行		23.0	29.7				70.4		106.5	
		全組織		21.3	29.9				69.8		105.1	
	R 5	慣行		24.3	31.8				71.9		100.5	
		全組織		22.0	29.9				71.5		107.4	
	平年値	慣行		22.0	29.9				71.5		107.4	
3	組織名		移植時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (株当)	(農) 細木宮農		4.8	7.6	22.2				26.7		19.0	19.0
	(農) 野田宮農		5.8	5.3								
	(農) 金戸宮農組合		5.3	5.4	11.6				27.1		17.1	17.1
	塔尾宮農組合		4.3	5.1	13.3				22.4			
	(農) 打尾宮農		4.7	5.3	17.2				23.5			
	(農) りんどう宮農		3.5	3.5	11.1				24.2		15.9	15.9
	(農) N S T アグリ		3.7	4.1	13.3							
	(農) 養谷実践組合		5.1	4.7	12.6				23.4		19.1	19.1
	(農) 堀越農産		4.8	5.6	15.3				28.2		20.4	20.4
	R 6	慣行		4.5	5.3	15.3			25.6		18.6	18.6
		全組織		4.8	5.3	14.8			25.1		18.3	18.3
	R 5	慣行		4.0	4.2	9.4			19.2		15.9	15.9
		全組織		3.8	4.6	10.6			21.1		16.4	16.4
	平年値	慣行		3.8	4.6	10.6			21.1		16.4	16.4
4	組織名		移植時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (m 当)	(農) 細木宮農		102	163	477				573		408	408
	(農) 野田宮農		133	123					479		302	302
	(農) 金戸宮農組合		94	95	205				499			
	塔尾宮農組合		96	114	296				553			
	(農) 打尾宮農		111	125	405				573		376	376
	(農) りんどう宮農		83	83	263				517		372	372
	(農) N S T アグリ		85	95	308				514		358	358
	(農) 養谷実践組合		89	81	219				403		333	333
	(農) 堀越農産		86	102	278				450		344	344
	R 6	慣行		90	107	309			517		372	372
		全組織		99	111	306			403		333	333
	R 5	慣行		82	87	196			450		344	344
		全組織		79	96	223			440		375	375
	平年値	慣行		79	96	223			440		375	375
5	組織名		移植時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
群落葉色	(農) 細木宮農				4.3	4.3	4.1		4.1	4.2	4.4	
	(農) 野田宮農					4.3	4.1			4.0	4.3	
	(農) 金戸宮農組合					4.3	4.2		4.2	4.0	4.2	
	塔尾宮農組合				4.3	4.2	4.0		3.9	3.8	4.2	
	(農) 打尾宮農				4.2	4.2	4.1		4.1	3.9	4.4	
	(農) りんどう宮農				4.2	4.3	4.1		4.2	4.2	4.3	
	(農) N S T アグリ				4.2	4.2	4.1			4.0	4.4	
	(農) 養谷実践組合				4.1	4.3	4.2		4.0	3.9	4.0	
	(農) 堀越農産				4.3	4.4	4.3		4.1	4.1	4.1	
	R 6	慣行			4.2	4.3	4.2		4.1	4.1	4.2	
		全組織			4.2	4.3	4.1		4.1	4.0	4.2	
	R 5	慣行			4.3		4.2		3.9	3.9	4.2	
		全組織			4.3	4.3	4.1		4.0	3.9	4.3	
	平年値	慣行			4.3	4.3	4.1		4.0	3.9	4.3	
	目標	なんと							3.8	4.0	4.3・4.5	



黒字を慣行として平均

今後の管理	6	組織名		移植時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
葉齢	(農) 細木宮農		2.7	5.6	8.7	10.4	12.0		13.2		14.4		
	(農) 野田宮農		2.4	4.7		10.2	12.0						
	(農) 金戸宮農組合		2.4	4.4		9.7	11.8		12.7		15.0		
	塔尾宮農組合		2.5	5.2	7.1	9.3	10.7		11.6		13.9		
	(農) 打尾宮農		2.4	5.0	7.8	9.5	11.3		12.4				
	(農) りんどう宮農		2.1	4.8	7.3	9.4	10.9		11.7		13.4		
	(農) N S T アグリ		3.7	5.4	8.1	10.2	11.2				13.8		
	(農) 養谷実践組合		2.0	4.2	6.8	9.0	10.8		11.6		13.0		
	(農) 堀越農産		3.0	5.0	7.9	10.1	11.8		12.7		14.0		
	R 6	慣行		2.5	4.9	7.7	9.7	11.4		12.3		13.7	
		全組織		2.4	4.8	7.6	9.7	11.4		12.3		14.0	
	R 5	慣行		2.5	4.7	7.0	9.1	11.5		12.0		14.1	
		全組織		2.7	4.6	6.9	8.9	11.6		11.9		14.0	
	平年値	慣行		2.7	4.6	6.9	8.9	11.6		11.9		14.0	


7	組織名		特裁	調査主体	慣行	1ヵ月後	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	抜き株	坪刈り	採取日	指摘事項
調査状況等	(農) 細木宮農		特裁	事務局	慣行								9/5	
	(農) 野田宮農		一般	生産者									9/7	調査抜け (5回)
	(農) 金戸宮農組合		一般	生産者									9/1	少し早刈り
	塔尾宮農組合		一般	生産者									9/4	成熟期の穂数データ無い
	(農) 打尾宮農		特裁	生産者									9/9	成熟期の穂数データ無い
	(農) りんどう宮農		一般	事務局	慣行								9/5	
	(農) N S T アグリ		一般	生産者									9/10	成熟期の穂数データ無い
	(農) 養谷実践組合		特裁	事務局	慣行								9/5	
	(農) 堀越農産		一般	生産者	慣行								9/6	調査お疲れ様でした。

天候															
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

収量調査	組織名	全重	ワラ重	初重	初ワラ比	粗立米重	精立米重	屑米重	粗ワラ割合
		kg/10a	kg/10a	kg/10a		kg/10a	kg/10a	kg/10a	%
	(農) 細木宮農	1751	820	863	1.1	707	672	35	77.9
	(農) 野田宮農	1311	643	618	1.0	508	488	19	78.9
	(農) 金戸宮農組合	1368	677	645	1.0	524	475	48	73.7
	塔尾宮農	1145	564	524	0.9	431	420	12	80.2
	(農) 打尾宮農	1262	577	631	1.1	513	492	20	78.0
	(農) りんどう宮農	1420	721	647	0.9	527	500	27	77.3
	(農) N S T アグリ	1752	644	1007	1.6	823	770	53	76.5
	(農) 森谷実践組合	1205	623	545	0.9	441	412	29	73.5
(農) 堀根農産	1317	612	651	1.1	523	488	34	75.1	
R 6	慣行	1423	694	676	1.0	549	518	31	76.4
	全組織	1347	655	640	1.0	522	493	28	77.1
R 5	慣行	1313	716	559	0.8	450	440	10	78.7
	平均値	1390	678	666	1.0	544	514	30	77.1




粒厚分布（％）	組織名	2.2mm以上	2.2・2.1	2.1・2.0	2.0・1.9	1.9・1.85	1.85・1.8	1.8・1.7	1.7mm以下	合計	1.9mm以上	1.85mm以下
	(農)稲米当農	14.8	42.8	31.0	6.4	1.9	0.9	1.2	1.1	100	95.0	96.9
	(農)野田当農	10.1	48.3	31.0	6.8	1.6	0.9	0.8	0.6	100	96.2	97.7
	(農)金戸當農組合	7.0	39.0	35.9	8.9	2.8	1.7	2.6	2.2	100	90.7	93.5
	塔尾當農組合	19.6	48.6	24.8	4.4	1.3	0.6	0.6	0.3	100	97.3	98.6
	(農)打尾當農	5.7	33.4	46.0	11.0	2.2	0.7	0.8	0.4	100	96.0	98.2
	(農)りんどう當農	7.5	37.3	41.1	9.0	2.1	0.9	1.1	1.1	100	94.9	96.9
	(農)NSTアグリ	4.5	27.2	48.2	13.7	3.0	1.4	1.2	0.8	100	93.6	96.6
	(農)養谷実践組合	4.0	28.5	49.7	11.2	2.7	1.1	1.6	1.2	100	93.4	96.1
	(農)堀越農産	4.2	33.2	44.6	11.4	2.7	1.3	1.5	1.2	100	93.4	96.1
R 6	慣行	7.6	35.5	41.6	9.5	2.3	1.0	1.3	1.1	100	94.2	96.5
	全組織	9.1	38.9	38.0	8.6	2.1	1.0	1.3	1.0	100	94.6	96.8
R 5	慣行	14.7	45.9	31.0	6.2	0.9	0.4	0.5	0.3	100	97.9	98.8
	平均値	8.2	38.0	35.5	13.0	1.9	1.0	1.2	1.1	100	94.6	96.6



黒字を慣行として平均

節間長・葉身長等	15	組織名		穂長	第1節間	第2節間	第3節間	第4節間	第5節間	第6節間	合計	葉身長1	葉身長2	葉身長3	倒伏割合(%)					倒伏率
				cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	少	中	多	甚	%	
		(農)細木宮農	19.0	38.8	20.3	14.6	9.8	4.1	0.2	87.8	30.3	41.7	41.4							
		(農)野田宮農	19.0	36.6	19.6	12.9	8.2	4.7	0.0	81.9										
		(農)金戸宮農組合	19.1	35.5	17.7	12.4	7.8	4.2	2.0	79.6										
		塔尾宮農組合	19.3	35.5	19.4	14.9	9.9	2.7	0.0	82.3										
		(農)打尾宮農	18.2	34.6	20.8	15.2	10.4	6.1	0.0	87.2										
		(農)りんどう宮農	19.1	36.3	20.4	13.0	9.4	1.9	0.2	81.2	30.4	40.6	40.8							
		(農)NSTアグリ	19.7	37.3	20.9	15.9	9.3	5.5	1.1	90.0										
		(農)養谷実践組合	18.3	38.2	20.4	15.9	9.4	3.3	0.3	87.3	27.1	39.5	43.7							
	(農)堀越農産	18.7	36.8	20.5	13.7	8.9	3.1	0.0	83.0											
R6	慣行	19.0	37.5	20.4	14.3	9.4	3.1	0.2	84.8	29.3	40.6	42.0								
	全組織	19.0	36.5	19.9	14.1	9.2	3.8	0.3	83.8	29.3	40.6	42.0								
R5	慣行	17.5	34.7	18.1	13.8	9.3	3.5	0.3	79.6	25.4	35.9	43.4								
	平年値	18.6	36.1	20.1	15.9	10.4	4.1	0.1	86.7	27.1	38.7	43.8								



外観品質・食味等	16	組織名	整粒	乳白粒	青未熟	基部	腹白	他未計	発芽粒	胴割粒	奇形粒	茶茶	斑点粒	タンパク	粒長	粒幅
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	mm	mm
		(農)細木宮農	66.5	0.6	4.9	0.7	0.3	24.8	0.0	1.3	0.2	0.2	0.0	6.2	5.25	3.03
		(農)野田宮農	77.2	0.0	0.9	0.3	0.2	20.3	0.0	0.2	0.3	0.3	0.0	5.9	5.21	2.97
		(農)金戸宮農	66.7	0.1	19.6	0.3	1.0	11.2	0.0	0.3	0.1	0.3	0.0	5.8	5.19	2.95
		塔尾宮農組合	70.0	0.4	2.6	0.7	0.2	24.7	0.0	0.9	0.2	0.1	0.0	5.9	5.12	2.97
		(農)打尾宮農	67.5	0.1	0.9	0.4	0.4	27.2	0.0	2.6	0.2	0.3	0.0	5.5	5.23	2.99
		(農)りんどう宮農	79.8	0.3	2.3	0.2	0.2	15.9	0.0	0.9	0.1	0.1	0.0	5.9	5.16	3.02
		(農)NSTアグリ	60.7	0.7	0.6	0.2	0.1	32.8	0.0	3.7	0.3	0.3	0.0	6.1	5.16	3.03
		(農)養実美枝組	73.3	0.1	6.2	0.5	0.4	18.7	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	5.4	5.19	2.96
	(農)堀越農産	67.9	0.6	0.7	0.6	0.3	28.3	0.0	0.5	0.2	0.6	0.0	5.5	5.05	2.94	
R 6	横行	71.9	0.4	3.5	0.5	0.3	21.9	0.0	0.8	0.1	0.3	0.0	5.8	5.16	2.99	
	全組織	71.1	0.3	4.8	0.5	0.4	21.4	0.0	0.9	0.2	0.3	0.0	5.8	5.18	2.98	
R 5	横行	67.9	0.5	1.1	1.0	0.9	23.5	0.0	4.1	0.2	0.3	0.0	5.7	5.16	2.90	
	平成産	73.6	0.7	2.9	1.0	0.9	12.6	0.0	2.0	0.1	0.1	0.2	5.9	5.10	3.07	