


令和6年度水稲調査結果


鉄コ コシヒカリ 1ヵ月後

1 調査日	年次	苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
R 6	事務局		5/27	6/3							
	全組織		5/27	6/3							
	慣行		5/29	6/6	6/19	7/3		7/17	7/28	8/10	9/2
	平年値		5/27	6/6	6/19	7/5		7/17	7/30	8/8	9/1


2 草丈 (cm)	組織名	苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
(農)いのくち	広安営農組合		12.1	20.3							
	宮後営農組合		11.1	13.7							
	(農)久保営農組合		5.9								
	米郷営農組合		15.6	20.5							
	R 6 事務局		12.1	20.3							
	R 6 全組織		11.2	18.2							
R 5 慣行			17.9	25.0				77.0		101.0	
	平年値		14.4	22.9				77.1		107.1	




3 茎数 (m当)	組織名	苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
(農)いのくち	広安営農組合		24.0	24.0	48.0						
	宮後営農組合		15.0	15.0	25.0						
	(農)久保営農組合		23.0	23.0							
	米郷営農組合		20.0	20.0	34.0						
	R 6 事務局		24.0	24.0	48.0						
	R 6 全組織		20.5	20.5	35.7						
R 5 慣行			24.3	27.3	85.0			114.0		127.0	127.0
	平年値		21.0	24.7	74.7			139.4		108.6	108.6
	目標	なんと	18~24	84~88	105~109	165~180		141.0		105~109	



4 茎数 (m²当)	組織名	苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
(農)いのくち	広安営農組合		80	80	160						
	宮後営農組合		50	50	83						
	(農)久保営農組合		77	77							
	米郷営農組合		67	67	113						
	R 6 事務局		80	80	160						
	R 6 全組織		68	68	119						
R 5 慣行			81	91	283			380		423	423
	平年値		70	82	249			465		362	362
	目標	なんと	60~80	280~290	350~360	550~600		470		350~360	




5 群落葉色	組織名	苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
(農)いのくち	広安営農組合										
	宮後営農組合										
	(農)久保営農組合										
	米郷営農組合										
	R 6 事務局										
	R 6 全組織										
R 5 慣行				4.3		4.3		3.9	3.9	4.1	
	平年値			4.2				4.0	4.1	4.2	
	目標	なんと						3.8	3.8	4.2~4.5	



今後の管理	調査日	幼穂形成期
・苗立ちに時間がかかったため、葉齢の展開が平年よりやや遅れています。葉齢を揃えると草丈、茎数は概ね平年並みに推移しています。 ・茎数が中干し目安の80本/mになったら、中干しを開始しましょう。中干しは、軽い田干しを数回繰り返し、小さな亀裂ができたなら完了です。その後は、間断かん水に切り替え、幼穂形成期頃(7/17頃)までに足跡の深さが3cm以下となるように、徐々に干し上げましょう。	7月15日(月)	

6 葉齢	組織名	苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
(農)いのくち	広安営農組合			3.2	4.6						
	宮後営農組合			3.4	5.4						
	(農)久保営農組合			1.5							
	米郷営農組合			3.4	5.1						
	R 6 事務局			3.2	4.6						
	R 6 全組織			2.9	5.0						
R 5 慣行			4.7	6.1	8.6	10.5		12.1		13.5	
	平年値		3.6	6.1	8.6	10.7		11.9		13.6	



7 雑草・病害虫	組織名	苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
作成中											
【雑草】①ヒエ、②ホタルイ、③コナギ、④ウリカワ、⑤オモダカ、⑥イボクサ、⑦クサネム、⑧カヤツリグサ、⑨タデ、⑩セリ、⑪藻、⑫その他											
【虫害】①イネミズゾウムシ、②イネゾウムシ、③ニカメイチュウ、④カメムシ類、⑤その他											
【病害】Ⅰ葉いもち・穂いもち、Ⅱ紋枯病、Ⅲ稲こうじ病、Ⅳごま葉枯病、Ⅴその他											

8 水管理(看板)	組織名	深水管理	浅水管理	中干し	間断かん水	飽水管理	湛水管理	間断かん水	収穫前落水
作成中									

<水管理看板の注意事項>

9 生育時期	組織名	播種日	幼穂形成期	~	出穂期	~	成熟期
(農)いのくち	広安営農組合	4/29					
	宮後営農組合	5/3					
	(農)久保営農組合	5/2					
	米郷営農組合	4/30					
	R 6 事務局	4/29					
	R 6 全組織	5/1					
R 5 慣行		5/1	7/16	21	8/6	33	9/8
	平年値	5/1	7/17	21	8/7	38	9/14

10 播種状況	組織名	播種量	播種深度	m苗立本数	m²苗立本数	苗立率	
(農)いのくち	広安営農組合	kg/10a	mm	本/m	本/m²	%	
	宮後営農組合	0.0	0.0	23.2	77.2		
	(農)久保営農組合	3.5	0.0	15.0	50.0	39.3	
	米郷営農組合	0.0	0.0	23.6	78.6		
	R 6 事務局	0.0	0.0	23.2	77.2		
	R 6 全組織	3.3	1.5	17.9	59.8	49.4	
R 5 慣行		3.4	0.0	24.3	81.1	67.6	
	平年値	3.5	1.0	21.0	70.1	56.3	
	目標	なんと	3.0~3.5	0.0	18~24	60~80	50~80