






令和6年度水稻調査結果

										鉄コ	コシヒカリ	幼穂形成期
1	年次		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
調査日	R 6	事務局		5/27	6/3	6/18	7/1		7/16	7/29		
		全組織		5/27	6/3	6/18	7/1		7/15	7/29		
	R 5	慣行		5/29	6/6	6/19	7/3		7/17	7/28	8/10	9/2
	平年値	慣行		5/27	6/6	6/19	7/5		7/17	7/30	8/8	9/1
2	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
草丈（cm）	(農)いのくち		12.1	20.3					83.6			
	広安営農組合		11.1	13.7					85.9			
	宮後営農組合		5.9									
	(農)久保営農組合		15.6	20.5					76.4			
	米郷営農組合								77.0			
	R 6	事務局	12.1	20.3					83.6			
		全組織	11.2	18.2					80.7			
	R 5	慣行	17.9	25.0					77.0		101.0	
	平年値	慣行	14.4	22.9					77.1		107.1	
3	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数（m当）	(農)いのくち	24.0	24.0	48.0					203.0			
	広安営農組合	15.0	15.0	25.0					168.0			
	宮後営農組合	23.0	23.0									
	(農)久保営農組合	20.0	20.0	34.0					131.0			
	米郷営農組合	8.7							147.0			
	R 6	事務局	24.0	24.0	48.0				203.0			
		全組織	18.1	20.5	35.7				162.3			
	R 5	慣行	24.3	27.3	85.0				114.0		127.0	127.0
	平年値	慣行	21.0	24.7	74.7				139.4		108.6	108.6
	目標	なんと	18~24		84~88	105~109	165~180		141.0			105~109
4	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数（m ² 当）	(農)いのくち	80	80	160					677			
	広安営農組合	50	50	83					560			
	宮後営農組合	77	77									
	(農)久保営農組合	67	67	113					437			
	米郷営農組合	29							490			
	R 6	事務局	80	80	160				677			
		全組織	60	68	119				541			
	R 5	慣行	81	91	283				380		423	423
	平年値	慣行	70	82	249				465		362	362
	目標	なんと	60~80		280~290	350~360	550~600		470			350~360
5	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
群落葉色	(農)いのくち				4.3	4.3			4.1	4.0		
	広安営農組合				4.4	4.4			4.4	4.1		
	宮後営農組合				4.3	4.2				4.0		
	(農)久保営農組合				4.2	4.3			4.1	4.0		
	米郷営農組合				4.2	4.5			4.4	4.1		
	R 6	事務局			4.3	4.3			4.1	4.0		
		全組織			4.3	4.3			4.3	4.0		
	R 5	慣行			4.3	4.3			3.9	3.9	4.1	
	平年値	慣行			4.2	4.3			4.0	4.1	4.2	
	目標	なんと							3.8	3.8	4.2~4.5	



今後の 管理	(生育ステージ) 幼穂形成期は平年並みの7月16日頃で、早いほ場で8月5日頃から出穂期になると予想される。 (生育) 葉色は平年並みの4.0 (水管理) 出穂期まで飽水管理で稲体の活力維持に努める。生育量が大きい場合は間断かん水を継続する。 (病虫害防除) 出穂状況を確認し、適期（1回目：穂揃期、2回目：1回目の1週間後）に防除する。												調査 次回 日	出穂10日前				
														7月28日(日)				
6	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期		R 6 事務局 R 6 全組織 R 5 平年値				
葉 齢	(農)いのくち			3.2	4.6	8.4	10.5		12.2									
	広安営農組合			3.4	5.4	9.1	11.3		13.3									
	宮後営農組合			1.5		7.3	9.4											
	(農)久保営農組合			3.4	5.1	8.4	10.1		12.5									
	米郷営農組合					7.4	10.0		11.9									
	R 6	事務局		3.2	4.6	8.4	10.5		12.2									
		全組織		2.9	5.0	8.1	10.3		12.5									
	R 5	慣行		4.7	6.1	8.6	10.5		12.1		13.5							
	平年値	慣行		3.6	6.1	8.6	10.7		11.9		13.6							
7	組織名		深水管理	ひたひた水	浅水管理	中干し	間断かん水	飽水管理	湛水管理	間断かん水	収穫前落水	8	組織名		中干し前	中干し完了	間断かん水時	幼穂形成期
水 管 理 (看板)	(農)いのくち		4/29	5/3	5/25		6/26						(農)いのくち			0	0	0
	広安営農組合												広安営農組合			3	0	
	宮後営農組合		5/11	5/18	5/30		6/5						宮後営農組合			1	0	
	(農)久保営農組合		5/2	5/10	5/20	6/20	7/1						(農)久保営農組合			1	0	
	米郷営農組合												米郷営農組合			10	8	
	R 6	事務局		4/29	5/3	5/25		6/26					R 6	事務局		0	0	0
		全組織		5/4	5/10	5/25	6/20	6/21						全組織		3	2	0
	R 5	慣行											R 5	慣行				
	平年値	慣行											平年値	慣行				
目安												目安	移植	15	10	5	1	