

水稻の生育状況

早生のほ場で藻が発生しているほ場や、深水のほ場がみられます。

藻が発生しているほ場は、軽い田干しを実施し、深水のほ場は浅水管理を徹底し、初期分げつの発生を促しましょう。その後、田植え28～30日後頃から中干しを開始しましょう。

当面の管理のポイント

移植

1 活着後の浅水管理 ～初期の分げつの発生を促進～

- (1) 中干しまでは、昼間止水、朝夕のかん水による浅水管理を継続し、水温・地温を高め、早期の茎数確保に努めましょう。
- (2) 藻が発生している場合は、早めに水の入れ換えを行いましょう。また、田がわいたり、苗が徒長しているほ場では、晴れた日に2日間程度の田干しを行い、根張りを良くしましょう。

2 溝切りと中干し ～適期の中干しで無効分げつを抑制、根の伸長促進～

- (1) 中干し開始前（田植え25日後頃）までに溝を5m（15～16条間）に1本以上設置し、必ず溝を水吐尻に連結して下さい。

- (2) 中干し開始時期の目安

移 植

◇田植え28～30日後頃から開始して下さい。

◇分げつが旺盛な場合はさらに早めに開始しましょう。

〔開始時期の目安〕

品 種	茎数（株当り）			葉齢7.5～8葉の時期 （平年値）	
	80株植	70株植	60株植		
五百万石・雄山錦	11～12本	13～14本	—	5/5植	6月 3日～ 5日頃
コシヒカリ	12～13本	14～15本	16～17本	5/13植	6月 9日～11日頃
てんこもり	—	16～17本	18～19本	5/7植	6月 6日～ 8日頃
山田錦	—	—	14～15本	5/10植	6月11日～13日頃

直 播

◇茎数が85本/m程度になったら、開始して下さい（てんこもりは100本/m程度）。

◇鉄コーティングでは分げつが旺盛になりやすいため、早めに開始しましょう。

〔開始時期の目安〕 （4月30日播種コシヒカリ）

方式	開始時期（平年値）
カルパーコーティング	6月 6日頃
鉄コーティング	6月11日頃

- (3) 中干しの程度

粘質土壌では4～5日間、黒ボク土壌では2～3日間の田干しを2～3回繰り返し、田面に小さな割れ目ができる程度としましょう。

※深い亀裂が入るような強い田干しは避けましょう。



写真 中干しによる根量の違い

カメムシの発生を抑えるため、大麦跡の雑草処理や畦畔の草刈りを行いましょう

3 雑草防除 営農のてびきP. 28～35参照 ホタルイなどの雑草処理限界葉齢も確認しましょう。

雑草が残った場合は、雑草の種類に応じて除草剤を遅れずに散布しましょう。また、粒剤の中後期剤は散布前に軽い田干しと溝切りをしてから、入水・散布しましょう。

(1) 中後期剤 (特別栽培米では使用しない)

	対象 雑草	使用薬剤	使用時期	10a当たり 使用量	総使用 回数	使用上の注意等
			移植			
特裁 米 使用 不可	ノビエ 広葉 雑草	サンパンチ 1和粒剤	移植後15日～ ノビエ3.5葉期まで (収穫60日前まで) ※稲4葉期～	1kg	1回	・散布後7日間は湛水状態を保つ。
		テッケン 1和粒剤	移植後15日～ ノビエ4葉期まで (収穫60日前まで) ※稲4葉期～	1kg	1回	・散布後7日間は湛水状態を保つ。
		ウィードコア1 キロ粒剤	移植後7日～ ノビエ4葉期まで (収穫60日前まで)	1kg	1回	・散布後7日間は湛水状態を保つ。
	広葉 雑草	バイスコープ 1キロ粒剤	移植後14日～60日 (収穫45日前まで)	1kg	1回	・湛水またはごく浅水で散布。 ・イネ科(ノビエ等)には効果がないので注意。 ・晴天が続く日を選んで散布する。

(2) 残草処理剤

	対象 雑草	使用薬剤	使用時期	10a当たり 使用量	総使用 回数	使用上の注意等
			移植			
特裁 米 使用 不可	ノビエ	クリンチャー 1和粒剤	移植後7日～ ノビエ4葉期まで (収穫30日前まで)	1kg	2回 以内	・残効性が無いので注意する。 ・ノビエの葉齢により使用量を調整。 ・多量の降雨が予想される場合や漏水が大きいほ場では使用しない。
			移植後25日～ ノビエ5葉期まで (収穫30日前まで)	1.5kg		
	ノビエ 広葉 雑草	クリンチャーバ スME液剤	移植後15日～ ノビエ5葉期まで (収穫50日前まで)	1,000ml	2回 以内	・晴天が続く日を選んで散布。 ・スポット処理可 ・落水またはごく浅水で散布
		ワイドパワー 粒剤	移植後20日～ ノビエ5葉期まで (収穫60日前まで)	3kg	1回	・ごく浅水状態で散布。3日間以上そのまゝの状態を保つ。 ・散布後7日間は降雨があっても落水しない。スポット処理可。
特別栽培米でも使用可	ノビエ	ヒエクリーン 1和粒剤	移植後15日～ ノビエ4葉期まで (収穫45日前まで)	1kg	1回	・多雨が予想される場合や漏水が大きいほ場で使用しない。
	広葉 雑草	バサグラン粒剤	移植後15日～ 収穫45日前まで	3～4kg	1回	・晴天日を選び、散布後4日間は入水・落水をしない。 ・散布時の水管理 粒剤：ごく浅水、液剤：落水 ・スポット処理可。
		バサグラン液剤		500～700 ml	2回 以内	
	ノビエ 広葉 雑草	ヒエクリーン バサグラン粒剤	移植後15日～ ノビエ4葉期まで (収穫45日前まで)	3kg	1回	・ごく浅水状態で散布し、3日間はそのままにして、その後湛水状態にする。散布後、降雨があっても落水しない。

※使用時はラベルの注意を読み、定められた使用法を遵守する。他の畑作物や河川等に拡散しないよう注意する。