

令和5年水稻調査結果

成熟期

移植

コシヒカリ

調査日	年次	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	R5	5/15	5/28	6/7	6/16	7/3	7/10	7/24	8/10	8/30	
	R4		5/26	6/5		7/4	7/10	7/24	8/7		
	平年値(R4-H25)		5/26	6/6	6/16	7/6	7/11	7/24	8/7		

草丈 (cm)	組織名	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)細木営農		25.9	34.9		70.2	76.5		103.2		
	(農)蓑谷実践組合		21.4	26.6			68.6		96.4		
	(農)打尾営農		27.8	30.9			70.2				
	(農)野田営農		16.8	22.6		64.5	72.4		99.6		
	(農)金戸営農組合		17.3	27.0			65.5		92.9		
	(農)NSTアグリ		30.6	33.5							
	(農)りんどう営農組合		32.4	38.5			76.8		109.5		
	R5		24.3	31.8			71.9		100.5		
	R4		22.5	29.3			78.2		110.6		
	平年値(R4-H25)		21.8	29.2			73.4		108.4		

茎数 (本/株)	組織名	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)細木営農	3.7	4.6	12.6		26.7	19.1		18.6	17.9	
	(農)蓑谷実践組合	4.6	4.4	9.4			22.4			16.3	
	(農)打尾営農	3.3	5.2	6.1			15.3				
	(農)野田営農	4.2	4.6	8.5		18.8	16.1			14.8	
	(農)金戸営農組合	4.8	5.0	7.7			16.6		14.9	14.7	
	(農)NSTアグリ	3.3	4.6	10.9							
	(農)りんどう営農組合	2.8	2.8	7.7			18.7			14.7	
	R5	4.0	4.2	9.4			19.2			15.9	
	R4	4.0	5.1	11.5			21.9			17.3	
	平年値(R4-H25)	3.7	4.6	10.3			21.4			16.3	
	目標	3～4		14.2	17.8	25.5	20.8			17.8	






茎数 (本/㎡)	組織名	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)細木営農	78	97	266		563	403		392	378	
	(農)蓑谷実践組合	96	92	196			467			340	
	(農)打尾営農	54	85	100			251				
	(農)野田営農	79	86	159		352	301			277	
	(農)金戸営農組合	92	96	148			318		285	282	
	(農)NSTアグリ	71	99	234							
	(農)りんどう営農組合	63	63	175			424			333	
	R5	82	87	196			403			333	
	R4	83	109	244			464			367	
	平年値(R4-H25)	79	98	215			452			349	
	目標	74		300	375	540	440			375	

葉齢	組織名	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)細木営農	2.7	4.8	7.4	9.4	11.9	12.4		14.0		
	(農)蓑谷実践組合	2.1	4.6	6.9	8.9	11.5	11.8		14.4		
	(農)打尾営農	2.8	4.8	6.0	8.5	10.9	11.4				
	(農)野田営農	2.5	4.3	6.3	8.9	11.6	12.1		13.8		
	(農)金戸営農組合	2.5	4.2	6.5	8.5	11.0	11.7		14.0		
	(農)NSTアグリ	3.1	5.3	5.7	8.2	11.0					
	(農)りんどう営農組合	2.8	5.3	7.2	9.4	11.6	12.2		14.0		
	R5	2.5	4.7	7.0	9.1	11.5	12.0		14.1		
	R4	2.3	4.8	7.1	11.7	12.4			13.9		
	平年値(R4-H25)	2.7	4.6	6.7	9.0	11.5	12.0		14.0		

群落葉色	組織名	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)細木営農			4.3		4.3	3.9	3.8	4.4		
	(農)蓑谷実践組合			4.3			4.2	3.8	4.0		
	(農)打尾営農					4.0	3.8				
	(農)野田営農			4.5		4.0	4.0	4.0	3.9		
	(農)金戸営農組合			4.2		4.0	4.0	3.8	4.2		
	(農)NSTアグリ			4.2		4.0					
	(農)りんどう営農組合			4.3		4.2	4.0	4.1	4.2		
	R5			4.3		4.2	3.9	3.9	4.2		
	R4			4.3		4.1	4.0	4.1	4.3		
	平年値(R4-H25)			4.3		4.1	4.0	4.0	4.3		
	目標						3.8	4.0	4.3～4.5		

生育時期・田植状況	組織名	田植日	幼穂形成期	～	出穂期	～	成熟期	田植日	基肥量 kg/10a	栽植密度 株/㎡	植付本数	植付深さ cm	苗丈 cm	葉齢	第1葉鞘長 cm
	(農)細木営農	5/12	7/9	20	7/29	32	8/30	5/12	30.0	21.1	3.8	3.9	15.4	2.7	4.1
	(農)蓑谷実践組合	5/14	7/13	22	8/4	29	9/2	5/14	20.0	20.8	4.7	4.1	17.0	2.1	4.9
	(農)打尾営農	5/10	7/10	23	8/2	29	8/31	5/10	25.0	16.4	3.3	3.7	15.8	2.8	3.5
	(農)野田営農	5/13	7/10	23	8/2	30	9/1	5/13	30.0	18.7	4.1	3.1	12.8	2.5	3.7
	(農)金戸営農組合	5/14	7/11	24	8/4	28	9/1	5/14	12.0	19.2	4.8	4.8	14.4	2.5	3.7
	(農)NSTアグリ	5/5	7/9	22	7/31	25	8/25	5/5	35.0	21.5	3.3	5.3	18.4	3.1	5.1
	(農)りんどう営農組合	5/9	7/10	21	7/31	31	8/31	5/9	30.0	22.7	2.7	4.8	18.3	2.8	4.0
	R5	5/12	7/11	22	8/2	30	9/1	5/12	23.0	20.9	4.0	4.4	16.3	2.5	4.2
	R4	5/10	7/8	24	8/1	39	9/9	5/10		21.1	4.2	3.5	15.4	2.3	4.1
	平年値(R4-H25)	5/12	7/11	22	8/2	39	9/10	5/12		21.1	4.0	3.6	14.8	2.7	3.8
	目標							5/15		21.2	3～4	3.0	12～13	2.5	3～3.5

平均は細木、蓑谷、金戸、林道



令和5年水稻調査結果

成熟期



移植 コシヒカリ

収量調査	組織名	全重	ワラ重	籾重	粗玄米重	精玄米重	屑米重	籾ワラ比	籾すり歩合
		kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a		%
	(農)細木営農	1585	887	659	534	528	6	0.74	80.1
	(農)蓑谷実践組合	1106	601	478	383	377	6	0.80	78.9
	(農)打尾営農			581	465	459	6		78.9
	(農)野田営農			530	431	427	4		80.6
	(農)金戸営農組合	1032	556	439	350	340	10	0.79	78.1
	(農)NSTアグリ			352	277	267	10		76.9
	(農)りんどう営農組合	1529	821	661	534	517	17	0.81	75.8
	R5	1313	716	559	450	441	10	0.78	78.2
R4		1435	698	694	570	544	26	0.99	78.3
	平年値(R4-H25)	1414	686	683	558	531	32	1.00	77.0


粒厚分布(%)	組織名	2.2mm以上	2.2～2.1mm	2.1～2.0mm	2.0～1.9mm	1.9～1.85mm	1.85～1.8mm	1.8～1.7mm	1.7mm以下	合計	1.9mm以上
	(農)細木営農	25.1	48.7	21.6	3.4	0.4	0.2	0.3	0.1	100.0	99.0
	(農)蓑谷実践組合	14.2	52.2	27.0	5.1	0.8	0.4	0.3	0.2	100.0	98.4
	(農)打尾営農	20.9	47.5	25.2	5.0	0.7	0.3	0.3	0.2	100.0	98.6
	(農)野田営農	26.7	52.6	17.2	2.4	0.4	0.1	0.3	0.1	100.0	99.0
	(農)金戸営農組合	7.1	39.1	41.6	9.5	1.2	0.6	0.7	0.4	100.0	97.2
	(農)NSTアグリ	7.4	33.5	43.5	12.0	1.7	0.6	0.9	0.5	100.0	96.4
	(農)りんどう営農組合	12.4	43.9	33.7	6.9	1.3	0.4	0.8	0.6	100.0	96.9
	R5	14.7	45.9	31.0	6.2	0.9	0.4	0.5	0.3	100.0	97.9
R4		12.3	44.3	30.8	8.4	1.4	0.7	1.1	1.0	100.0	95.8
	平年値(R4-H25)	7.0	36.7	36.3	14.4	2.0	1.1	1.2	1.2	100.0	94.4

収量構成要素	組織名	㎡当穂数 本/㎡	一穂籾数 粒/穂	㎡当籾数 粒/㎡	登熟歩合 %	千粒重 g	理論収量 kg/10a
	(農)細木営農	378	67	253	92.3	22.6	528
	(農)蓑谷実践組合	340	62	209	90.1	21.7	409
	(農)打尾営農		91		90.0	22.9	
	(農)野田営農	277	81	225	89.8	21.9	442
	(農)金戸営農組合	282	67	189	89.6	20.8	352
	(農)NSTアグリ		63		88.0	21.4	
	(農)りんどう営農組合	333	83	275	88.2	21.5	523
	R5	333	70	232	90.0	21.7	453
R4		367	81	296	83.2	22.6	557
	平年値(R4-H25)	349	78	273	84.8	22.9	526
	目標	375	75	280	85.0	22.7	540

収量構成要素(目標比)



節間長・葉身長等	組織名	穂長 cm	節間長(cm)							葉身長(cm)			倒伏率 %
			第1節間	第2節間	第3節間	第4節間	第5節間	第6節間	合計	止葉	第2葉	第3葉	
	(農)細木営農	17.7	35.3	18.8	14.6	10.1	3.5	0.3	82.6	26.0	34.4	46.9	0.0
	(農)蓑谷実践組合	17.7	34.5	16.7	12.5	7.9	1.7	0.1	73.4	23.5	36.1	40.4	0.0
	(農)打尾営農	21.4	39.1	17.3	11.6	6.9	2.0		76.8	31.7	41.7	43.1	0.0
	(農)野田営農	19.0	37.0	17.2	12.3	7.1	3.6	0.2	77.4				0.0
	(農)金戸営農組合	16.1	31.7	15.9	12.1	8.9	4.9	0.4	73.8	22.3	33.8	40.2	0.0
	(農)NSTアグリ	17.3	34.9	16.9	11.8	8.5	2.1	0.0	74.2				0.0
	(農)りんどう営農組合	18.8	37.2	20.9	16.2	10.4	3.7	0.3	88.8	29.8	39.3	46.3	0.0
	R5	17.5	34.7	18.1	13.8	9.3	3.5	0.3	79.6	25.4	35.9	43.4	0.0
R4		19.8	37.8	21.3	15.2	10.4	4.0	0.2	88.8	30.2	39.8	45.2	0.0
	平年値(R4-H25)	18.6	36.3	20.4	16.2	10.5	4.2	0.1	87.6	27.5	39.2	43.8	0.0



食味・外観品質	組織名	整粒 %	基白 %	腹白 %	乳白 %	青未熟 %	その他未熟 %	胴割粒 %	奇形粒 %	茶米 %	斑点粒 %	玄米蛋白 %	粒型(mm)	
													粒長	粒幅
	(農)細木営農	57.9	2.1	1.4	1.2	0.6	31.2	4.3	0.4	0.3	0.0	5.8	5.25	2.94
	(農)蓑谷実践組合	73.0	0.7	0.6	0.3	0.9	22.0	1.4	0.1	0.1	0.0	5.5	5.14	2.89
	(農)打尾営農	60.2	1.1	1.7	1.4	4.9	26.2	3.5	0.2	0.1	0.0	5.5	5.27	3.04
	(農)野田営農	70.0	0.6	1.0	0.8	0.0	22.6	4.1	0.2	0.2	0.0	5.5	5.15	2.86
	(農)金戸営農組合	69.4	0.5	1.0	0.1	0.7	22.7	4.5	0.3	0.4	0.0	5.6	5.10	2.85
	(農)NSTアグリ	62.9	0.2	0.7	0.2	0.3	27.9	5.3	0.3	1.5	0.0	5.8	5.11	2.94
	(農)りんどう営農組合	71.2	0.5	0.7	0.3	2.3	18.1	6.1	0.1	0.2	0.0	5.9	5.12	2.91
	R5	67.9	1.0	0.9	0.5	1.1	23.5	4.1	0.2	0.3	0.0	5.7	5.15	2.90
R4		78.1	1.1	0.7	3.4	3.7	9.2	3.1	0.0	0.0	0.2	5.9	5.10	3.11
	平年値(R4-H25)	73.2	1.1	1.0	6.5	2.9	10.6	1.8	0.1	0.0	0.3	6.3	5.10	3.09

平均は細木、蓑谷、金戸、林道

令和5年水稻調査結果

成熟期

カルパー

コシヒカリ

調査日	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	R5	5/29	6/7	6/19	7/3		7/10	7/24	8/10	8/30	
	R4	5/27	6/5				7/10	7/24	8/5		
	平年値(R4-H25)	5/26	6/7	6/18	7/8		7/15	7/27	8/5		

草丈（cm）	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)是安営農組合	25.1	29.8				74.7		105.9		
	R5	25.1	29.8				74.7		105.9		
	R4	19.8	24.3				81.1		118.0		
	平年値(R4-H25)	19.6	27.2				78.0		113.0		






茎数（本／㎡）	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)是安営農組合	25	104				153		120	115	
	R5	25	104				153		120	115	
	R4	20	62				120		106	106	
	平年値(R4-H25)	26	91				145		109	110	
	目標	18～24	86	107	173		141			109	

茎数（本／㎡）	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)是安営農組合	83	347				510		400	383	
	R5	83	347				510		400	383	
	R4	65	205				400		352	352	
	平年値(R4-H25)	88	312				480		345	355	
	目標	60～80	285	355	575		470			360	

葉齢	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)是安営農組合	4.8	6.7	8.8	10.3		11.0		12.8		
	R5	4.8	6.7	8.8	10.3		11.0		12.8		
	R4	3.8	6.6				12.3		14.2		
	平年値(R4-H25)	3.4	6.4	8.3	10.8		11.7		13.7		

群落葉色	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)是安営農組合				4.0		4.0	3.7	4.4		
	R5				4.0		4.0	3.7	4.4		
	R4		4.4				4.3	4.1	4.3		
	平年値(R4-H25)		4.3		4.0		3.9	4.1	4.4		
	目標						3.8	3.8	4.2～4.5		

生育時期・播種状況	組織名	播種日	幼穂形成期	～	出穂期	～	成熟期	播種日	基肥量 kg/10a	播種量 kg/10a	播種深度 mm	苗立本数 本/㎡	苗立率 %	
	(農)是安営農組合	5/1	7/11	18	7/29	33	8/31	5/1	20.0	2.9	15.0	84.7	81.7	
	R5	5/1	7/11	18	7/29	33	8/31	5/1	20.0	2.9	15.0	84.7	81.7	
	R4	5/1	7/13	23	8/5	40	9/14	5/1		3.0	7.1	52.0	47.6	
	平年値(R4-H25)	5/2	7/14	22	8/5	40	9/14	5/2		3.0	6.6	69.5	62.3	
	目標							4/30～5/10		2.5～3.0	10.0	60～80	50～80	



令和5年水稻調査結果

成熟期

カルパー



コシヒカリ

収量調査	組織名	全重	ワラ重	粳重	粗玄米重	精玄米重	屑米重	粳ワラ比	粳すり歩合
		kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a		%
	(農)是安営農組合	1521	890	595	473	467	6	0.67	73.2
	R5	1521	890	595	473	467	6	0.67	73.2
	R4	1516	795	683	549	478	71	0.86	70.2
	平年値(R4-H25)	1438	743	654	536	504	34	0.89	77.1


粒厚分布(%)	組織名	2.2mm以上	2.2～2.1mm	2.1～2.0mm	2.0～1.9mm	1.9～1.85mm	1.85～1.8mm	1.8～1.7mm	1.7mm以下	合計	1.9mm以上
	(農)是安営農組合	16.9	52.0	24.6	5.2	0.7	0.3	0.2	0.2	100.0	98.7
	R5	16.9	52.0	24.6	5.2	0.7	0.3	0.2	0.2	100.0	98.7
	R4	4.5	24.9	40.7	17.1	4.2	1.8	3.5	3.4	100.1	87.2
	平年値(R4-H25)	5.5	31.4	38.9	17.1	3.0	1.3	1.5	1.3	100.0	92.9

収量構成要素	組織名	㎡当穂数 本/㎡	一穂粳数 粒/穂	㎡当粳数 粒/㎡	登熟歩合 %	千粒重 g	理論収量 kg/10a
	(農)是安営農組合	383	60	232	92.2	22.1	473
	R5	383	60	232	92.2	22.1	473
	R4	352	82	287	70.8	22.4	446
	平年値(R4-H25)	355	75	267	81.5	22.9	498
	目標	360	75	270	84.0	22.5	510

収量構成要素(目標比)



節間長・葉身長等	組織名	穂長	節間長 (cm)							葉身長 (cm)			倒伏率
		cm	第1節間	第2節間	第3節間	第4節間	第5節間	第6節間	合計	止葉	第2葉	第3葉	%
	(農)是安営農組合	17.2	34.8	19.1	16.3	11.0	6.0	0.4	87.6	22.7	33.7	43.7	0.0
	R5	17.2	34.8	19.1	16.3	11.0	6.0	0.4	87.6	22.7	33.7	43.7	0.0
	R4	19.8	37.9	20.9	17.3	11.3	5.6	0.2	93.2	28.7	41.7	49.1	
平年値(R4-H25)	18.5	36.3	20.5	16.2	11.0	4.3	0.1	88.4	26.5	39.1	46.6		



食味・外観品質	組織名	整粒 %	基白 %	腹白 %	乳白 %	青未熟 %	その他未熟 %	胴割粒 %	奇形粒 %	茶米 %	斑点粒 %	玄米蛋白 %	粒型 (mm)	
													粒長	粒幅
	(農)是安営農組合	66.4	1.3	1.3	0.6	0.4	23.8	4.2	0.6	0.8	0.0	5.8	5.18	2.94
	R5	66.4	1.3	1.3	0.6	0.4	23.8	4.2	0.6	0.8	0.0	5.8	5.18	2.94
	R4	80.4	0.9	0.5	2.9	6.7	7.2	0.5	0.0	0.0	0.1	6.6	5.19	3.11
	平年値(R4-H25)	79.0	0.8	0.6	2.7	3.3	10.6	0.9	0.0	0.1	0.2	6.3	5.13	3.09

令和5年水稻調査結果

成熟期

鉄コシヒカリ

調査日	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	R5	5/30	6/6	6/19	7/3	7/12	7/18	7/29	8/11	9/4	
	R4	5/27	6/5			7/11	7/18	7/31	8/8		
	平年値(R4-H25)	5/26	6/7	6/18	7/8	7/12	7/17	7/31	8/8		

草丈（cm）	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)大鋸屋営農組合	17.3	19.8			70.7	71.0		94.4		
	(農)いのくち	14.7	30.3			73.1	79.6		103.2		
	R5	16.0	25.1			71.9	75.3		98.8		
	R4	14.5	20.1			68.8	79.9		111.5		
	平年値(R4-H25)	14.1	22.7			67.1	76.5		109.6		






茎数（本／m）	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)大鋸屋営農組合	28	99			211	128			132	
	(農)いのくち	17	37			178	106			113	
	R5	23	68			195				123	
	R4	24	54			162				124	
	平年値(R4-H25)	23	71			159				109	
	目標	18～24	86	107	173		141			105	

茎数（本／m ² ）	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)大鋸屋営農組合	93	330			703	427			440	
	(農)いのくち	57	123			593	353			377	
	R5	75	227			648				408	
	R4	78	178			538				413	
	平年値(R4-H25)	78	221			529				365	
	目標	60～80	285	355	575		470			350	

葉齢	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)大鋸屋営農組合	4.8	5.7	8.6	10.4	11.3	11.8		13.4		
	(農)いのくち	4.0	6.3	8.7	10.9	11.9	12.6		14.0		
	R5	4.4	6.0	8.6	10.6	11.6	12.2		13.7		
	R4	3.3	5.8			11.5	12.3		13.5		
	平年値(R4-H25)	3.4	6.0	8.5	11.1	11.3	11.9		13.7		

群落葉色	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)大鋸屋営農組合		4.5		4.2	3.9	3.9	3.8	3.9		
	(農)いのくち		4.1		4.3	4.0	4.0	4.0	4.2		
	R5		4.3		4.3	4.0	4.0	3.9	4.1		
	R4		4.0			4.3	4.1	4.2	4.2		
	平年値(R4-H25)		4.2		4.2	4.3	4.0	4.1	4.3		
	目標						3.8	3.8	4.2～4.5		

生育時期・播種状況	組織名	播種日	幼穂形成期	～	出穂期	～	成熟期	播種日	基肥量 kg/10a	播種量 kg/10a	播種深度 mm	苗立本数 本/m ²	苗立率 %	
	(農)大鋸屋営農組合	5/1	7/17	21	8/7	32	9/8	5/1	25.0	3.5	0.0	86.0	67.6	
	(農)いのくち	5/1	7/15	22	8/6	33	9/8	5/1	30.0	3.6	0.0	59.3	45.3	
	R5	5/1	7/16	22	8/7	32	9/8	5/1	27.5	3.6	0.0	72.7	56.4	
	R4	5/2	7/19	22	8/10	38	9/17	5/2		3.6	3.2	75.8	63.3	
	平年値(R4-H25)	5/2	7/18	21	8/8	40	9/17	5/2		3.5	1.4	68.2	54.1	
	目標							4/30～5/10		3.0～3.5	0.0	60～80	50～80	



令和5年水稻調査結果

成熟期



鉄コシヒカリ

収量調査	組織名	全重	ワラ重	粃重	粗玄米重	精玄米重	屑米重	粃ワラ比	粃すり歩合
		kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a		%
	(農)大鋸屋宮農組合	1302	728	538	430	418	12	0.74	78.5
	(農)いのくち	1310	731	546	441	434	6	0.75	77.7
	R5	1306	730	542	436	426	9	0.74	78.1
	R4	1582	829	717	584	540	44	0.86	75.4
	平年値(R4-H25)	1441	741	659	539	502	37	0.89	76.3


粒厚分布(%)	組織名	2.2mm以上	2.2～2.1mm	2.1～2.0mm	2.0～1.9mm	1.9～1.85mm	1.85～1.8mm	1.8～1.7mm	1.7mm以下	合計	1.9mm以上
	(農)大鋸屋宮農組合	8.4	49.4	31.6	7.7	1.2	0.4	0.7	0.6	100.0	97.1
	(農)いのくち	16.6	56.3	20.9	4.7	0.8	0.2	0.1	0.2	100.0	98.6
	R5	12.5	52.9	26.3	6.2	1.0	0.3	0.4	0.4	100.0	97.8
	R4	4.4	34.7	40.4	13.1	2.2	1.0	1.9	2.4	100.1	92.6
	平年値(R4-H25)	4.7	30.0	39.3	18.3	2.9	1.6	1.6	1.6	100.0	92.3

収量構成要素	組織名	㎡当穂数 本/㎡	一穂粃数 粒/穂	㎡当粃数 粒/㎡	登熟歩合 %	千粒重 g	理論収量 kg/10a
	(農)大鋸屋宮農組合	440	52	231	84.9	21.4	419
	(農)いのくち	377	66	249	89.3	22.1	491
	R5	408	59	240	87.1	21.7	455
	R4	390	75	293	70.2	22.5	463
	平年値(R4-H25)	362	73	266	80.7	22.9	487
	目標	350	75	263	80.0	22.5	470

収量構成要素(目標比)



節間長・葉身長等	組織名	穂長 cm	節間長(cm)							葉身長(cm)			倒伏率 %
			第1節間	第2節間	第3節間	第4節間	第5節間	第6節間	合計	止葉	第2葉	第3葉	
	(農)大鋸屋宮農組合	17.3	35.0	17.7	13.9	9.0	3.0	0.1	78.6				0.0
	(農)いのくち	19.7	38.4	18.9	12.9	8.0	1.7	0.1	80.0	30.2	44.5	41.2	0.0
	R5	18.5	36.7	18.3	13.4	8.5	2.4	0.1	79.3	30.2	44.5	41.2	0.0
	R4	19.8	37.0	20.2	17.4	11.1	4.8	0.4	90.9	29.6	47.6	47.4	
	平年値(R4-H25)	18.5	36.3	20.2	16.1	11.2	3.9	0.1	87.8	27.7	40.0	44.6	



食味・外観品質	組織名	整粒 %	基白 %	腹白 %	乳白 %	青未熟 %	その他未熟 %	胴割粒 %	奇形粒 %	茶米 %	斑点粒 %	玄米蛋白 %	粒型(mm)	
													粒長	粒幅
	(農)大鋸屋宮農組合	75.7	0.3	0.6	0.4	1.1	18.7	1.7	0.2	0.7	0.0	5.9	5.10	2.86
	(農)いのくち	71.2	0.9	1.0	1.4	0.2	21.6	2.1	0.2	0.2	0.0	5.9	5.12	2.87
	R5	73.5	0.6	0.8	0.9	0.7	20.2	1.9	0.2	0.5	0.0	5.9	5.11	2.86
	R4	82.3	0.5	0.3	2.3	5.7	8.1	0.2	0.0	0.1	0.0	6.2	5.14	3.11
	平年値(R4-H25)	80.8	0.7	0.5	1.7	5.0	8.7	0.5	0.1	0.4	0.1	6.3	5.11	3.08

令和5年水稻調査結果

成熟期

調査日	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	R5	5/30	6/6	6/19	7/3		7/18	7/29	8/10	9/3	
	R4	5/27	6/5				7/18	7/31	8/8		
	平年値(R4-H25)	5/27	6/7		7/5		7/18	7/31	8/8		

草丈（cm）	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)久保営農組合	21.7	25.0				80.5		105.3		
	広安営農組合	13.8	22.1				77.5		102.9		
	R5	17.8	23.6				79.0		104.1		
	R4	10.8	18.8				80.3		107.3		
	平年値(R4-H25)	11.5	21.2				78.4		109.3		

茎数（本／m）	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)久保営農組合	30	119				108			136	
	広安営農組合	19	27				104			87	
	R5	25	73							112	
	R4	19	47							100	
	平年値(R4-H25)	20	63							90	
	目標	18～24	86	107	173		141			105	






茎数（本／m ² ）	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)久保営農組合	100	397				360			453	
	広安営農組合	63	90				347			290	
	R5	82	243							372	
	R4	62	155							332	
	平年値(R4-H25)	67	211							301	
	目標	60～80	285	355	575		470			350	

葉齢	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)久保営農組合	5.3	6.2	8.6	10.4		12.0		13.0		
	広安営農組合	3.9	5.3	8.3	9.9		11.4		13.0		
	R5	4.6	5.8	8.4	10.1		11.7		13.0		
	R4	3.0	5.3				12.0		13.1		
	平年値(R4-H25)	2.8	5.9		10.6		11.7		13.3		

群落葉色	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)久保営農組合		4.2		4.3		3.9	3.9	4.2		
	広安営農組合				4.3		3.9	4.0	4.0		
	R5		4.2		4.3		3.9	4.0	4.1		
	R4		4.1				4.1	4.2	4.3		
	平年値(R4-H25)		4.2		4.3		4.1	4.1	4.3		
	目標						3.8	3.8	4.2～4.5		

生育時期・播種状況	組織名	播種日	幼穂形成期	～	出穂期	～	成熟期	播種日	基肥量 kg/10a	播種量 kg/10a	播種深度 mm	苗立本数 本/m ²	苗立率 %	
	(農)久保営農組合	5/3	7/17	19	8/5	34	9/8	5/3	25.0	3.0	0.0	98.0	89.8	
	広安営農組合	5/3	7/14	22	8/5	35	9/9	5/3	25.0	3.5	1.0	66.0	51.9	
	R5	5/3	7/16	20	8/5	35	9/9	5/3	25.0	3.3	0.5	82.0	70.8	
	R4	5/5	7/18	21	8/8	39	9/16	5/5		3.3	1.2	60.0	51.3	
	平年値(R4-H25)	5/3	7/19	21	8/9	38	9/16	5/3		3.3	1.0	64.1	54.3	
	目標							4/30～5/10		3.0～3.5	0.0	60～80	50～80	

べんがら コシヒカリ



令和5年水稻調査結果


成熟期

べんがら


コシヒカリ

収量調査	組織名	全重	ワラ重	籾重	粗玄米重	精玄米重	屑米重	籾ワラ比	籾すり歩合
		kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a		%
	(農)久保営農組合	1658	896	717	568	559	9	0.80	79.5
	広安営農組合	1626	832	755	608	600	8	0.91	78.0
	R5	1642	864	736	588	580	9	0.85	78.8
	R4	1597	830	713	584	544	40	0.86	76.2
	平年値(R4-H25)	1385	693	635	529	494	35	0.92	77.8

収量調査(平年比)





粒厚分布(%)	組織名	2.2mm以上	2.2～2.1mm	2.1～2.0mm	2.0～1.9mm	1.9～1.85mm	1.85～1.8mm	1.8～1.7mm	1.7mm以下	合計	1.9mm以上
	(農)久保営農組合	9.1	49.4	32.5	7.4	0.9	0.3	0.3	0.2	100.0	98.4
	広安営農組合	27.1	51.3	16.1	4.1	0.6	0.3	0.3	0.1	100.0	98.7
	R5	18.1	50.4	24.3	5.8	0.8	0.3	0.3	0.2	100.0	98.5
	R4	4.4	34.7	40.4	13.1	2.2	1.0	1.9	2.4	100.1	92.6
	平年値(R4-H25)	5.8	32.8	39.0	15.7	2.7	0.9	1.7	1.6	100.0	93.2




収量構成要素	組織名	㎡当穂数 本/㎡	一穂籾数 粒/穂	㎡当籾数 粒/㎡	登熟歩合 %	千粒重 g	理論収量 kg/10a
	(農)久保営農組合	453	66	298	87.3	21.5	560
	広安営農組合	290	80	233	87.5	22.4	457
	R5	372	73	266	87.4	22.0	508
	R4	332	79	262	78.8	22.6	465
	平年値(R4-H25)	301	76	228	81.9	22.6	418
	目標	350	75	263	80.0	22.5	470

収量構成要素(目標比)



節間長・葉身長等	組織名	穂長 cm	節間長(cm)							葉身長(cm)			倒伏率 %
			第1節間	第2節間	第3節間	第4節間	第5節間	第6節間	合計	止葉	第2葉	第3葉	
	(農)久保営農組合	17.9	35.5	18.1	14.9	10.6	5.4	0.4	84.8	23.6	35.7	41.7	0.0
	広安営農組合	18.5	36.4	16.1	12.7	8.9	3.1		77.2				0.0
	R5	18.2	35.9	17.1	13.8	9.7	4.2	0.4	81.2	23.6	35.7	41.7	0.0
	R4	17.5	36.3	20.0	16.1	10.7	5.0	0.2	88.3	23.7	40.7	43.9	
	平年値(R4-H25)	18.0	35.5	19.7	16.0	11.6	4.2	0.1	87.1	26.2	38.5	46.4	



食味・外観品質	組織名	整粒 %	基白 %	腹白 %	乳白 %	青未熟 %	その他未熟 %	胴割粒 %	奇形粒 %	茶米 %	斑点粒 %	玄米蛋白 %	粒型(mm)	
													粒長	粒幅
	(農)久保営農組合	72.1	0.3	0.7	0.9	0.6	21.9	1.9	0.3	0.3	0.0	5.9	5.10	2.91
	広安営農組合	58.3	1.1	1.1	4.7	1.3	29.1	1.9	0.3	0.8	0.0	6.0	5.17	2.88
	R5	65.2	0.7	0.9	2.8	1.0	25.5	1.9	0.3	0.6	0.0	6.0	5.13	2.89
	R4	83.7	0.4	0.2	1.1	3.0	10.6	0.4	0.0	0.1	0.2	6.2	5.14	3.13
	平年値(R4-H25)	81.8	0.3	0.4	1.3	2.1	10.9	1.2	0.0	0.1	0.2	6.1	5.11	3.08

令和5年水稻調査結果

成熟期

調査日	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	R5	5/29	6/3	6/19	7/4		7/17	7/30	8/11	9/10	
	R4										
	平年値(R4-H25)										

草丈 (cm)	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	米郷営農組合	18.4	26.6				85.8		111.7		
	R5	18.4	26.6				85.8		111.7		
	R4										
	平年値(R4-H25)										

茎数 (本/m)	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	米郷営農組合	16	52				131			118	
	R5	16	52				131			118	
	R4										
	平年値(R4-H25)										
	目標	18～24	86	107	173		141			105	

茎数 (本/m ²)	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	米郷営農組合	53	173				437			393	
	R5	53	173				437			393	
	R4										
	平年値(R4-H25)										
	目標	60～80	285	355	575		470			350	






葉齢	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	米郷営農組合	4.3	5.5	8.8	10.8		11.0		13.2		
	R5	4.3	5.5	8.8	10.8		11.0		13.2		
	R4										
	平年値(R4-H25)										

群落葉色	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	米郷営農組合		4.2		4.3		4.0	4.0	4.1		
	R5		4.2		4.3		4.0	4.0	4.1		
	R4										
	平年値(R4-H25)										
	目標						3.8	3.8	4.2～4.5		

生育時期・播種状況	組織名	播種日	幼穂形成期	～	出穂期	～	成熟期	播種日	基肥量 kg/10a	播種量 kg/10a	播種深度 mm	苗立本数 本/m ²	苗立率 %	
	米郷営農組合	4/29	7/14	21	8/4	32	9/5	4/29	28.0	3.5	15.0	52.0	40.9	
	R5	4/29	7/14	21	8/4	32	9/5	4/29	28.0	3.5	15.0	52.0	40.9	
	R4													
	平年値(R4-H25)													
	目標							4/30～5/10		3.0～3.5	0.0	60～80	50～80	

イナリモ

コシヒカリ





令和5年水稻調査結果



成熟期

イナリモ コシヒカリ

収 量 調 査	組織名	全重	ワラ重	粳重	粗玄米重	精玄米重	屑米重	粳ワラ比	粳すり歩合
		kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a		%
	米郷営農組合	2151	1091	966	778	741	36	0.89	79.5
	R5	2151	1091	966	778	741	36	0.89	79.5
	R4								
	平年値(R4-H25)								

[illegible]

收量構成要素	組織名	m ² 当穂数 本/m ²	一穂粒数 粒/穂	m ² 当粒数 粒/m ²	登熟歩合 %	千粒重 g	理論収量 kg/10a
	米郷営農組合	393	77	304	86.6	21.9	577
	R5	393	77	304	86.6	21.9	577
	R4						
	平年値(R4-H25)						
目標	350	75	263	80.0	22.5	470	

[illegible][illegible]

令和5年水稻調査結果

成熟期

移植

てんこもり

調査日	組織名	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	R5	5/13	5/29	6/6	6/18	7/4	7/10	7/23	8/11	9/7	
	R4		5/26	6/5		7/4	7/10	7/24	8/7		
	平年値(R4-H25)		5/26	6/7	6/16	7/6	7/12	7/24	8/7		

草丈 (cm)	組織名	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	上津見営農組合		24.0	26.0		58.3	65.9		97.5		
	塔尾営農組合		24.1	24.5			59.0		95.8		
	(農)細野鉢伏農産		22.1	26.2		58.7	64.3		95.5		
	R5		23.1	26.1		58.5	65.1		96.5		
	R4		17.2	21.8		57.2	64.2		103.9		
	平年値(R4-H25)		20.5	25.4		56.9	66.8		101.9		

茎数 (本/株)	組織名	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	上津見営農組合	3.9	6.2	12.6		26.0	23.3		21.4	21.4	
	塔尾営農組合	3.1	3.4	7.5			20.9			21.4	
	(農)細野鉢伏農産	4.7	5.1	10.7		22.6	26.6			19.1	
	R5	4.3	5.7	11.7		24.3	25.0			20.3	
	R4	4.3	4.5	9.7		26.2	26.9			20.4	
	平年値(R4-H25)	3.7	5.5	12.4		27.1	26.7			20.5	
	目標	3～4		17.0	21.2	33.0	27.4			21.2	






茎数 (本/m ²)	組織名	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	上津見営農組合	87	139	282		582	521		479	479	
	塔尾営農組合	51	56	123			342			350	
	(農)細野鉢伏農産	104	113	236		499	587			422	
	R5	96	126	259		540	554			450	
	R4	82	86	183		488	503			379	
	平年値(R4-H25)	75	111	260		555	543			416	
	目標	74		360	450	700	580			450	

葉齢	組織名	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	上津見営農組合	2.2	5.1	6.7	9.3	11.8	12.4		14.8		
	塔尾営農組合	4.4	4.8	6.2	9.3	11.8	12.4		15.4		
	(農)細野鉢伏農産	2.6	4.8	6.3	9.1	12.2	12.7		14.6		
	R5	2.4	5.0	6.5	9.2	12.0	12.5		14.7		
	R4	2.4	4.9	6.9		12.4	13.4		15.3		
	平年値(R4-H25)	2.8	5.3	7.6	9.6	12.4	13.1		14.6		

群落葉色	組織名	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	上津見営農組合			4.4		4.4	4.0	4.0	4.4		
	塔尾営農組合			4.2		4.2	4.2	4.5	4.6		
	(農)細野鉢伏農産			4.2		4.2	4.0	4.3	4.3		
	R5			4.3		4.3	4.0	4.2	4.4		
	R4			4.5		4.1	4.2	4.2	4.4		
	平年値(R4-H25)			4.5		4.2	4.2	4.2	4.4		
	目標						4.0以上	4.3	4.5		

生育時期・田植状況	組織名	田植日	幼穂形成期	～	出穂期	～	成熟期	田植日	基肥量 kg/10a	栽植密度 株/m ²	植付本数	植付深さ cm	苗丈 cm	葉齢	第1葉鞘長 cm
	上津見営農組合	5/10	7/13	21	8/3	39	9/11	5/10	45.0	22.4	4.0	3.6	15.2	2.2	3.8
	塔尾営農組合	5/15	7/13	21	8/3	38	9/10	5/15	40.0	16.4	3.1	3.0	16.7	4.4	4.1
	(農)細野鉢伏農産	5/13	7/15	21	8/5	37	9/11	5/13	40.0	22.1	4.8	4.5	15.2	2.6	4.1
	R5	5/12	7/14	21	8/4	38	9/11	5/12	42.5	22.2	4.4	4.1	15.2	2.4	4.0
	R4	5/12	7/12	25	8/6	48	9/23	5/12		18.7	4.3	3.4	13.8	2.4	3.8
	平年値(R4-H25)	5/8	7/14	22	8/5	46	9/20	5/8		20.3	3.9	3.2	13.0	2.8	3.3
	目標							5/10～15		21.2	3～4	3.0	12～13	2.5	3～3.5

平均は上津見、細野



令和5年水稻調査結果


成熟期

移植


てんこもり

収量調査	組織名	全重	ワラ重	粳重	粗玄米重	精玄米重	屑米重	粳ワラ比	粳すり歩合
		kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a		%
	上津見営農組合	1774	923	801	658	653	5	0.87	78.1
	塔尾営農組合			800	655	645	10		81.6
	(農)細野鉢伏農産	1454	737	669	543	532	11	0.91	80.7
	R5	1614	830	735	601	593	8	0.89	79.4
	R4	1459	658	766	648	580	68	1.16	76.0
	平年値(R4-H25)	1539	736	752	634	583	48	1.03	79.6

収量調査(平年比)





粒厚分布(%)	組織名	2.2mm以上	2.2～2.1mm	2.1～2.0mm	2.0～1.9mm	1.9～1.85mm	1.85～1.8mm	1.8～1.7mm	1.7mm以下	合計	1.9mm以上
	上津見営農組合	11.0	52.8	30.7	4.8	0.3	0.2	0.2	0.1	100.0	99.3
	塔尾営農組合	20.3	56.0	18.5	3.8	0.6	0.2	0.5	0.2	100.0	98.5
	(農)細野鉢伏農産	7.4	48.3	35.0	7.3	0.8	0.4	0.5	0.5	100.0	97.9
	R5	9.2	50.5	32.9	6.0	0.5	0.3	0.3	0.3	100.0	98.6
	R4	1.1	12.1	50.9	27.4	3.6	1.7	1.9	1.2	99.9	91.5
	平年値(R4-H25)	2.2	18.7	46.4	25.4	3.2	1.5	1.4	1.2	100.0	92.7




収量構成要素	組織名	m²当穂数 本/m²	一穂粒数 粒/穂	m²当粒数 粒/m²	登熟歩合 %	千粒重 g	理論収量 kg/10a
	上津見営農組合	479	67	319	92.1	22.0	647
	塔尾営農組合	350	118	411	86.5	20.3	723
	(農)細野鉢伏農産	422	68	289	81.5	21.4	503
	R5	450	68	304	86.8	21.7	575
	R4	374	93	336	74.4	22.1	551
	平年値(R4-H25)	419	77	320	80.6	22.2	563
	目標	450	70	315	85.0	22.5	600

収量構成要素(目標比)



節間長・葉身長等	組織名	穂長	節間長(cm)							葉身長(cm)			倒伏率
		cm	第1節間	第2節間	第3節間	第4節間	第5節間	第6節間	合計	止葉	第2葉	第3葉	%
	上津見営農組合	18.3	35.3	18.0	10.9	6.7	1.6	0.1	72.5	26.1	38.4	38.3	0.0
	塔尾営農組合	21.4	39.2	18.1	12.0	6.9	1.8		78.0				0.0
	(農)細野鉢伏農産	18.2	36.2	17.6	10.7	7.1	1.6		73.2				0.0
	R5	18.2	35.7	17.8	10.8	6.9	1.6	0.1	72.9	26.1	38.4	38.3	0.0
R4	20.8	37.8	19.4	12.6	7.5	2.4	0.0	79.7	30.6	40.4	37.6	0.0	
平年値(R4-H25)	19.3	36.1	19.0	12.9	8.0	2.5	0.0	78.6	27.8	37.2	40.9	0.0	



食味・外観品質	組織名	整粒 %	基白 %	腹白 %	乳白 %	青未熟 %	その他未熟 %	胴割粒 %	奇形粒 %	茶米 %	斑点粒 %	玄米蛋白 %	粒型(mm)	
													粒長	粒幅
	上津見営農組合	82.2	0.2	0.5	0.1	0.1	15.0	0.8	0.4	0.2	0.0	5.9	5.11	2.86
	塔尾営農組合	81.7	0.1	0.3	0.1	0.7	15.4	0.9	0.1	0.0	0.0	6.4	5.10	2.86
	(農)細野鉢伏農産	76.3	0.3	0.2	0.8	1.2	18.7	1.7	0.1	0.2	0.0	6.0	5.18	2.87
	R5	79.3	0.3	0.4	0.5	0.7	16.9	1.3	0.3	0.2	0.0	6.0	5.14	2.86
	R4	86.0	0.1	0.3	0.9	2.9	8.7	0.5	0.1	0.1	0.0	6.5	5.10	3.03
	平年値(R4-H25)	83.7	0.2	0.3	0.7	3.0	8.9	0.5	0.0	0.1	0.1	6.6	5.11	3.04

平均は上津見、細野


令和5年水稻調査結果

成熟期


カルパー てんこもり

調査日	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	R5	5/26	6/7	6/16			7/18	7/28	8/17	8/30	
	R4	5/27	6/5				7/18	7/31	8/11		
	平年値(R4-H25)	5/27	6/7	6/18			7/17	7/31	8/11		


草丈（cm）	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)千福営農	15.2	25.4				73.7		105.2		
	R5	15.2	25.4				73.7		105.2		
	R4	15.7	21.8				72.7		96.6		
	平年値(R4-H25)	14.5	23.8				74.5		102.0		




茎数（本／m）	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)千福営農	27	76				184			181	
	R5	27	76				184			181	
	R4	33	99				106			109	
	平年値(R4-H25)	31	119				184			142	
	目標	18～24	102		203					127	




茎数（本／m²）	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)千福営農	90	253				613			603	
	R5	90	253				613			603	
	R4	110	330				353			363	
	平年値(R4-H25)	103	397				613			472	
	目標	60～80	340		675					420	



葉齢	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)千福営農	3.2	6.7	8.7			13.6		15.3		
	R5	3.2	6.7	8.7			13.6		15.3		
	R4	4.0	6.6				12.9		15.7		
	平年値(R4-H25)	3.6	6.9	9.0			12.6		14.4		



群落葉色	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)千福営農		4.3				4.1	4.3	4.2		
	R5		4.3				4.1	4.3	4.2		
	R4		4.4				4.1	4.3	4.4		
	平年値(R4-H25)		4.3				4.0	4.1	4.4		
	目標						4.0以上	4.2	4.3～4.5		



生育時期・播種状況	組織名	播種日	幼穂形成期	～	出穂期	～	成熟期	播種日	基肥量 kg/10a	播種量 kg/10a	播種深度 mm	苗立本数 本/m²	苗立率 %	
	(農)千福営農	5/3	7/18	22	8/9	39	9/17	5/3	35.0	3.0	7.5	90.7	83.1	
	R5	5/3	7/18	22	8/9	39	9/17	5/3	35.0	3.0	7.5	90.7	83.1	
	R4	4/30	7/22	22	8/13	42	9/24	4/30		3.0	5.1	89.4	82.0	
	平年値(R4-H25)	4/30	7/18	22	8/9	44	9/22	4/30		3.1	5.9	88.7	74.5	
	目標							4/30～5/4		3.0	10.0	60～80	50～80	

令和5年水稻調査結果

成熟期

カルパー



てんこもり

収量調査	組織名	全重	ワラ重	籾重	粗玄米重	精玄米重	屑米重	籾ワラ比	籾すり歩合
		kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a		%
	(農)千福営農	1755	909	787	643	624	18	0.87	79.3
	R5	1755	909	787	643	624	18	0.87	79.3
	R4	1453	755	642	548	495	53	0.85	77.1
	平年値(R4-H25)	1693	877	772	640	584	56	0.89	75.9


粒厚分布(%)	組織名	2.2mm以上	2.2～2.1mm	2.1～2.0mm	2.0～1.9mm	1.9～1.85mm	1.85～1.8mm	1.8～1.7mm	1.7mm以下	合計	1.9mm以上
	(農)千福営農	2.7	28.3	51.5	14.7	1.4	0.3	0.6	0.4	100.0	
	R5	2.7	28.3	51.5	14.7	1.4	0.3	0.6	0.4	100.0	97.2
	R4	0.3	8.1	47.8	34.2	4.2	1.7	1.9	1.7	99.9	90.4
	平年値(R4-H25)	2.8	18.9	41.8	28.3	3.6	1.6	1.6	1.5	100.0	91.8

収量構成要素	組織名	m ² 当穂数 本/m ²	一穂籾数 粒/穂	m ² 当籾数 粒/m ²	登熟歩合 %	千粒重 g	理論収量 kg/10a
	(農)千福営農	603	68	408	88.8	22.2	805
	R5	603	68	408	88.8	22.2	805
	R4	363	79	286	72.9	22.3	465
	平年値(R4-H25)	472	71	333	78.9	22.3	578
	目標	420	75	315	80.0	22.5	570

収量構成要素(目標比)



節間長・葉身長等	組織名	穂長 cm	節間長(cm)							葉身長(cm)			倒伏率 %
			第1節間	第2節間	第3節間	第4節間	第5節間	第6節間	合計	止葉	第2葉	第3葉	
	(農)千福営農	18.7	36.7	18.5	14.5	9.6	4.0	0.4	83.7	23.7	34.9	42.9	0.0
	R5	18.7	36.7	18.5	14.5	9.6	4.0	0.4	83.7	23.7	34.9	42.9	0.0
	R4	17.2	33.8	18.0	12.3	8.2	4.2	0.7	77.2	21.9	34.8	42.0	
	平年値(R4-H25)	18.5	36.4	19.6	13.7	8.8	3.6	0.1	82.3	26.2	36.3	42.9	



食味・外観品質	組織名	整粒	基白	腹白	乳白	青未熟	その他未熟	胴割粒	奇形粒	茶米	斑点粒	玄米蛋白	粒型(mm)	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	粒長	粒幅
	(農)千福営農	87.4	0.3	0.3	0.5	0.7	10.4	0.1	0.0	0.1	0.1	6.1	5.13	3.00
	R5	87.4	0.3	0.3	0.5	0.7	10.4	0.1	0.0	0.1	0.1	6.1	5.13	3.00
	R4	88.7	0.0	0.0	0.1	1.9	9.1	0.0	0.0	0.1	0.0	6.5	5.13	2.99
	平年値(R4-H25)	82.6	0.4	0.2	0.5	2.3	11.5	0.1	0.0	0.0	0.1	6.4	5.15	3.02


令和5年水稻調査結果

成熟期


鉄コ てんこもり

調査日	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	R5	5/30	6/4	6/19	7/3		7/17	8/1	8/17	9/16	
	R4	5/27	6/5				7/18	7/31	8/11		
	平年値(R4-H25)	5/27	6/6	6/19			7/17	7/31	8/11		


草丈（cm）	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)池田営農組合	11.8	17.9				66.9		99.2		
	R5	11.8	17.9				66.9		99.2		
	R4	7.4	17.6				73.6		103.3		
	平年値(R4-H25)	8.4	17.7				69.7		98.9		




茎数（本／m）	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)池田営農組合	34	52				211			161	
	R5	34	52				211			161	
	R4	26	58				144			132	
	平年値(R4-H25)	26	68				163			122	
	目標	18～24	102		203					127	




茎数（本／m²）	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)池田営農組合	113	173				703			537	
	R5	113	173				703			537	
	R4	87	193				480			438	
	平年値(R4-H25)	87	225				540			402	
	目標	60～80	340		675					420	



葉齢	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)池田営農組合	3.4	4.6	7.7	9.6		11.3		13.2		
	R5	3.4	4.6	7.7	9.6		11.3		13.2		
	R4	3.2	5.4				12.4		14.6		
	平年値(R4-H25)	3.2	5.9	8.4			12.4		14.6		



群落葉色	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)池田営農組合				4.3		4.0	3.8	4.2		
	R5				4.3		4.0	3.8	4.2		
	R4		4.3				4.3	4.3	4.2		
	平年値(R4-H25)		4.3				4.3	4.3	4.3		
	目標						4.0以上	4.2	4.3～4.5		



生育時期・播種状況	組織名	播種日	幼穂形成期	～	出穂期	～	成熟期	播種日	基肥量 kg/10a	播種量 kg/10a	播種深度 mm	苗立本数 本/m²	苗立率 %	
	(農)池田営農組合	5/5	7/21	21	8/11	39	9/19	5/5	39.5	3.9	0.0	112.7	79.4	
	R5	5/5	7/21	21	8/11	39	9/19	5/5	39.5	3.9	0.0	112.7	79.4	
	R4	5/4	7/22	24	8/15	45	9/29	5/4		3.3	1.1	82.2	69.8	
	平年値(R4-H25)	5/3	7/21	24	8/14	42	9/25	5/3		3.4	0.5	80.5	75.2	
	目標							4/30～5/4		3.5	0.0	60～80	50～80	


令和5年水稻調査結果

成熟期


鉄コ てんこもり

収量調査	組織名	全重	ワラ重	粳重	粗玄米重	精玄米重	屑米重	粳ワラ比	粳すり歩合
		kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a		%
	(農)池田営農組合	1861	1015	778	649	630	20	0.77	76.8
	R5	1861	1015	778	649	630	20	0.77	76.8
	R4	1490	779	647	541	433	108	0.83	68.4
	平年値(R4-H25)	1452	744	660	547	485	61	0.89	73.7

収量調査(平年比)





粒厚分布(%)	組織名	2.2mm以上	2.2～2.1mm	2.1～2.0mm	2.0～1.9mm	1.9～1.85mm	1.85～1.8mm	1.8～1.7mm	1.7mm以下	合計	1.9mm以上
	(農)池田営農組合	3.8	25.9	51.5	15.9	1.4	0.5	0.7	0.6	100.0	96.9
	R5	3.8	25.9	51.5	15.9	1.4	0.5	0.7	0.6	100.0	96.9
	R4	0.6	2.5	34.9	52.3	4.9	2.6	1.7	0.7	100.2	90.3
	平年値(R4-H25)	1.0	11.2	43.1	34.4	4.3	2.5	2.0	1.5	100.0	89.7




収量構成要素	組織名	㎡当穂数 本/㎡	一穂粳数 粒/穂	㎡当粳数 粒/㎡	登熟歩合 %	千粒重 g	理論収量 kg/10a
	(農)池田営農組合	537	67	360	87.3	21.4	674
	R5	537	67	360	87.3	21.4	674
	R4	438	74	326	53.5	21.1	360
	平年値(R4-H25)	408	67	275	70.9	21.7	419
	目標	420	75	315	80.0	22.5	570

収量構成要素(目標比)



節間長・葉身長等	組織名	穂長 cm	節間長(cm)							葉身長(cm)			倒伏率 %
			第1節間	第2節間	第3節間	第4節間	第5節間	第6節間	合計	止葉	第2葉	第3葉	
	(農)池田営農組合	18.9	36.0	17.4	12.0	8.0	2.1		75.4				0.0
	R5	18.9	36.0	17.4	12.0	8.0	2.1		75.4				0.0
	R4	17.5	34.7	20.3	13.9	8.9	3.8	0.4	82.0				
	平年値(R4-H25)	18.2	35.4	19.0	12.2	8.0	2.6	0.1	77.3	25.6	34.7	41.0	



食味・外観品質	組織名	整粒	基白	腹白	乳白	青未熟	その他未熟	胴割粒	奇形粒	茶米	斑点粒	玄米蛋白	粒型(mm)	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	粒長	粒幅
	(農)池田営農組合	85.4	0.0	0.0	0.1	0.8	11.9	1.1	0.3	0.1	0.0	6.2	5.24	2.85
	R5	85.4	0.0	0.0	0.1	0.8	11.9	1.1	0.3	0.1	0.0	6.2	5.24	2.85
	R4	84.2	0.3	0.4	0.4	5.3	8.8	0.2	0.0	0.1	0.1	6.7	5.10	2.95
	平年値(R4-H25)	80.6	0.6	0.4	0.7	2.3	12.3	0.4	0.0	1.3	0.1	5.9	5.13	2.98

令和5年水稻調査結果

成熟期

移植

富富富

調査日	組織名	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	R5	5/24	5/30	6/7	6/19	7/3	7/10	7/24	8/10	8/30	
	R4		5/26	6/5		7/4	7/10	7/24	8/8		
	近年値(R4-H29)		5/27	6/5	6/14	7/5	7/11	7/24	8/8		

草丈 (cm)	組織名	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)堀越農産		20.0	26.4			64.0		90.4		
	R5		20.0	26.4			64.0		90.4		
	R4		12.7	24.8			70.7		101.8		
	近年値(R4-H29)		15.9	23.8			66.0		93.1		






茎数 (本/株)	組織名	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)堀越農産	3.2	2.7	5.4			22.4			16.8	
	R5	3.2	2.7	5.4			22.4			16.8	
	R4	5.0	5.1	8.6			27.7			23.1	
	近年値(R4-H29)	3.9	4.1	5.8			25.2			17.8	
	目標	3～4		15.1		28.3	27.3			18.9	

茎数 (本/m ²)	組織名	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)堀越農産	67	56	113			467			350	
	R5	67	56	113			467			350	
	R4	73	74	125			403			336	
	近年値(R4-H29)	76	80	107			496			346	
	目標	74		320		600	580			400	

葉齢	組織名	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)堀越農産	3.7	4.8	6.3	8.8	11.0	11.7		14.0		
	R5	3.7	4.8	6.3	8.8	11.0	11.7		14.0		
	R4	2.5	3.6	6.5		11.7	12.4		14.8		
	近年値(R4-H29)	2.5	3.9	5.7	7.9	11.1	11.7		13.9		

群落葉色	組織名	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)堀越農産			4.3		4.5	4.3	4.6	4.3		
	R5			4.3		4.5	4.3	4.6	4.3		
	R4			4.3		4.4		4.3	4.3		
	近年値(R4-H29)			4.3	4.4	4.4		4.2	4.3		
	目標						4.0	4.2以上	4.4		

生育時期・田植状況	組織名	田植日	幼穂形成期	～	出穂期	～	成熟期	田植日	基肥量 kg/10a	栽植密度 株/m ²	植付本数	植付深さ cm	苗丈 cm	葉齢	第1葉鞘長 cm
	(農)堀越農産	5/17	7/13	22	8/4	30	9/3	5/17		20.8	3.2	3.2	13.9	3.7	3.2
	R5	5/17	7/13	22	8/4	30	9/3	5/17		20.8	3.2	3.2	13.9	3.7	3.2
	R4	5/17	7/14	26	8/9	41	9/19	5/17		14.7	4.6	3.1	10.2	2.5	2.9
	近年値(R4-H29)	5/18	7/15	23	8/7	40	9/16	5/18		19.9	3.9	3.5	12.8	2.5	3.6
	目標							5/15		21.2	3～4	3.0	11～12	2.5	3～3.5




令和5年水稻調査結果

成熟期


移植

富富富

収量調査	組織名	全重	ワラ重	籾重	粗玄米重	精玄米重	屑米重	籾ワラ比	籾すり歩合
		kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a		%
	(農)堀越農産	1414	701	692	545	507	38	0.99	79.6
	R5	1414	701	692	545	507	38	0.99	79.6
	R4	1081	520	524	432	362	70	1.01	69.0
	近年値(R4-H29)	1243	552	645	526	454	72	1.17	70.6





粒厚分布(%)	組織名	2.2mm以上	2.2～2.1mm	2.1～2.0mm	2.0～1.9mm	1.9～1.85mm	1.85～1.8mm	1.8～1.7mm	1.7mm以下	合計	1.9mm以上
	(農)堀越農産	2.5	21.7	47.6	21.3	3.6	1.3	1.4	0.5	100.0	93.1
	R5	2.5	21.7	47.6	21.3	3.6	1.3	1.4	0.5	100.0	93.1
	R4	1.2	14.6	43.0	26.9	4.9	2.6	3.6	3.1	99.9	85.7
	近年値(R4-H29)	2.5	20.4	38.0	24.4	5.4	3.0	3.5	2.7	100.0	85.3




収量構成要素	組織名	㎡当穂数 本/㎡	一穂籾数 粒/穂	㎡当籾数 粒/㎡	登熟歩合 %	千粒重 g	理論収量 kg/10a
	(農)堀越農産	350	90	314	78.6	20.3	501
	R5	350	90	314	78.6	20.3	501
	R4	335	88	295	63.4	20.9	391
	近年値(R4-H29)	337	87	291	70.8	21.8	444
	目標	400	75	300	80.0	22.3	540

収量構成要素(目標比)



節間長・葉身長等	組織名	穂長 cm	節間長(cm)							葉身長(cm)			倒伏率 %
			第1節間	第2節間	第3節間	第4節間	第5節間	第6節間	合計	止葉	第2葉	第3葉	
	(農)堀越農産	18.4	32.1	16.0	10.2	6.4	1.6	0.0	66.2	26.4	37.0	40.2	0.0
	R5	18.4	32.1	16.0	10.2	6.4	1.6	0.0	66.2	26.4	37.0	40.2	0.0
	R4	20.2	33.0	16.3	9.9	6.2	2.0	0.0	67.4	35.7	45.0	44.7	0.0
	近年値(R4-H29)	18.9	33.4	16.2	11.2	7.2	1.8	0.0	69.8	29.5	38.8	44.1	0.0



食味・外観品質	組織名	整粒 %	基白 %	腹白 %	乳白 %	青未熟 %	その他未熟 %	胴割粒 %	奇形粒 %	茶米 %	斑点粒 %	玄米蛋白 %	粒型(mm)	
													粒長	粒幅
	(農)堀越農産	59.8	0.3	0.4	0.2	7.0	27.4	3.3	0.2	0.6	0.0	5.6	4.96	2.91
	R5	59.8	0.3	0.4	0.2	7.0	27.4	3.3	0.2	0.6	0.0	5.6	4.96	2.91
	R4	80.2	0.4	0.4	2.0	6.5	10.0	0.2	0.0	0.0	0.0	5.8	4.92	3.07
	近年値(R4-H29)	76.7	0.5	0.4	2.0	5.9	10.2	1.6	0.0	0.0	0.3	5.8	4.99	3.08

令和5年水稻調査結果

成熟期

移植

五百万石

調査日	組織名	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	最高分げつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	R5	5/9	5/19	5/31	6/13	6/22	6/26	7/4	7/24	8/17	
	R4		5/18	5/29	6/13	6/20	6/26	7/10	7/24		
	平年値(R4-H25)		5/21	5/31	6/13	6/21	6/27	7/9	7/24		

草丈 (cm)	組織名	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	最高分げつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)国広営農		16.8	23.9		45.5	53.5		92.8		
	上原営農組合		19.5	25.1			51.4				
	(農)理休営農		19.9	29.2		48.8	49.9		99.0		
	(農)長楽寺営農組合		23.2	32.3			57.6		101.3		
	高清水農産		15.4	23.4		44.1	50.2		97.2		
	(農)蛇喰営農組合		12.7	23.4			41.4		94.8		
	R5		17.4	25.5		46.1	51.2		96.3		
	R4		17.1	25.1		42.1	55.9		95.4		
	平年値(R4-H25)		20.5	26.0		48.0	55.1		98.3		

茎数 (本/株)	組織名	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	最高分げつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)国広営農	4.0	4.0	10.5		22.2	23.3		13.7	13.7	
	上原営農組合	3.6	3.6	5.0			18.4			14.0	
	(農)理休営農	3.0	3.1	7.7		16.5	15.2		13.3	13.3	
	(農)長楽寺営農組合	2.9	3.0	8.7			14.8				
	高清水農産	3.2	3.0	8.0		15.6	15.4		14.7	14.7	
	(農)蛇喰営農組合	3.5	3.6	5.2			22.8			13.9	
	R5	3.4	3.4	8.7		18.1	18.0		13.9	13.9	
	R4	3.7	3.7	11.8		22.0	22.3		14.1	14.1	
	平年値(R4-H25)	3.5	4.2	10.2		21.2	19.6		14.6	14.6	
	目標	3～4		11.6	14.5	20.0	17.8			14.5	






茎数 (本/m ²)	組織名	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	最高分げつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)国広営農	99	99	259		548	575		338	338	
	上原営農組合	85	85	117			432			329	
	(農)理休営農	83	86	214		458	422		369	369	
	(農)長楽寺営農組合	72	74	215			365				
	高清水農産	80	75	201		391	386		368	368	
	(農)蛇喰営農組合	83	86	124			543			331	
	R5	87	87	225		466	461		359	359	
	R4	86	87	276		514	520		327	328	
	平年値(R4-H25)	80	98	234		487	458		346	338	
	目標	85		280	350	490	430			350	

葉齢	組織名	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	最高分げつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)国広営農	2.4	4.5	7.5	9.8	11.4	11.9	13.3	14.0		
	上原営農組合	3.0	4.8	6.4			11.2	12.7	13.2		
	(農)理休営農	2.7	4.6	7.2	9.5	10.7	11.5	12.5	13.2		
	(農)長楽寺営農組合	3.3	5.4	6.5	10.7		11.7	13.9	14.4		
	高清水農産	3.0	4.8	6.8	9.1	10.4	10.9	12.0	13.0		
	(農)蛇喰営農組合	2.7	4.3	6.0	9.4		11.2	12.5	13.6		
	R5	2.7	4.6	7.2	9.5	10.8	11.4	12.6	13.4		
	R4	2.6	4.4	7.5	9.7	10.6	11.8		13.9		
	平年値(R4-H25)	2.9	4.9	7.2	9.5	10.9	11.7		14.0		

群落葉色	組織名	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	最高分げつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)国広営農			4.3		4.3	4.3	4.3	4.4		
	上原営農組合			4.5			4.4	4.4	4.6		
	(農)理休営農			4.4		4.2	4.4	4.3	4.4		
	(農)長楽寺営農組合			4.2			4.4	4.3	4.2		
	高清水農産			4.4		4.3	4.3	4.3	4.5		
	(農)蛇喰営農組合			4.2			4.3	4.3	4.6		
	R5			4.4		4.3	4.3	4.3	4.4		
	R4			4.5		4.3	4.3	4.3	4.5		
	平年値(R4-H25)			4.4		4.5	4.3	4.4	4.6		
	目標					4.0	4.3～4.5	4.5～4.7			

生育時期・田植状況	組織名	田植日	幼穂形成期	～	出穂期	～	成熟期	田植日	基肥量 kg/10a	栽植密度 株/m ²	植付本数	植付深さ cm	苗丈 cm	葉齢	第1葉鞘長 cm
	(農)国広営農	5/5	6/26	18	7/14	34	8/17	5/5	32.0	24.7	4.1	3.4	13.9	2.4	4.0
	上原営農組合	5/3	6/26	20	7/16	33	8/18	5/3	35.0	23.5	3.6	3.1	13.2	3.0	3.1
	(農)理休営農	5/6	6/25	20	7/15	33	8/17	5/6	35.0	27.8	3.1	4.0	13.6	2.7	4.0
	(農)長楽寺営農組合	5/3	6/24	19	7/13	35	8/17	5/3	32.0	24.7	2.9	3.3	14.1	3.3	2.9
	高清水農産	5/3	6/27	17	7/14	35	8/18	5/3	35.0	25.1	3.2	3.1	13.8	3.0	3.4
	(農)蛇喰営農組合	5/10	6/29	20	7/19	31	8/19	5/10	35.0	23.8	3.6	3.3	10.7	2.7	3.2
	R5	5/5	6/26	18	7/14	34	8/17	5/5	34.0	25.8	3.5	3.5	13.8	2.7	3.8
	R4	5/4	6/27	19	7/16	36	8/21	5/4		23.4	3.9	3.4	13.9	2.6	3.7
	平年値(R4-H25)	5/5	6/27	20	7/17	37	8/23	5/5		22.8	3.7	3.2	12.9	2.9	3.3
	目標							5/5		24.2	3～4	3.0	12～13	2.5	3～3.5

平均は国広、理休、高清水




令和5年水稻調査結果

成熟期


移植

五百万石

収量調査	組織名	全重	ワラ重	粳重	粗玄米重	精玄米重	屑米重	粳ワラ比	粳すり歩合
		kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a		%
	(農)国広営農	1310	594	673	551	484	67	1.13	71.9
	上原営農組合			687	561	455	107		66.2
	(農)理休営農	1461	650	770	629	561	68	1.18	72.9
	(農)長楽寺営農組合			739	600	527	73		71.3
	高清水農産	1343	604	674	546	410	136	1.12	60.8
	(農)蛇喰営農組合			646	529	463	66		71.6
	R5	1371	616	706	575	485	90	1.14	68.5
	R4	1224	510	675	548	460	88	1.32	68.6
	平年値(R4-H25)	1263	505	704	577	486	90	1.39	70.7





粒厚分布(%)	組織名	2.5mm以上	2.5～2.4mm	2.4～2.3mm	2.3～2.2mm	2.2～2.1mm	2.1～2.0mm	2.0mm以下	合計	2.1mm以上	
	(農)国広営農	0.1	0.7	8.6	46.3	32.1	9.8	2.4	100.0	87.8	
	上原営農組合	0.0	0.3	2.5	40.6	37.6	14.3	4.8	100.0	81.0	
	(農)理休営農	0.2	1.1	5.3	53.1	29.6	8.2	2.6	100.0	89.2	
	(農)長楽寺営農組合	0.1	0.7	4.6	62.2	20.2	5.4	6.7	100.0	87.9	
	高清水農産	0.1	0.5	4.5	29.0	41.1	18.6	6.3	100.0	75.1	
	(農)蛇喰営農組合	0.0	0.7	8.3	45.4	33.0	9.4	3.1	100.0	87.5	
	R5	0.1	0.8	6.1	42.8	34.3	12.2	3.8	100.0	84.0	
	R4	0.0	0.2	4.8	48.1	31.4	10.5	5.0	100.0	84.5	
	平年値(R4-H25)	0.1	0.7	8.2	43.4	31.2	10.9	5.5	100.0	83.6	




収量構成要素	組織名	㎡当穂数 本/㎡	一穂粳数 粒/穂	㎡当粳数 百粒/㎡	登熟歩合 %	千粒重 g	理論収量 kg/10a
	(農)国広営農	338	64	216	78.3	25.1	424
	上原営農組合	329	77	253	54.4	25.3	349
	(農)理休営農	369	70	260	65.5	25.0	425
	(農)長楽寺営農組合		86		55.3	25.4	
	高清水農産	368	88	323	49.5	24.8	397
	(農)蛇喰営農組合	331	77	254	70.2	25.9	461
	R5	359	74	266	64.4	25.0	415
	R4	327	71	235	73.5	26.6	449
	平年値(R4-H25)	338	75	254	69.9	26.6	465
	目標	350	73	256	75.0	26.6	510

収量構成要素(目標比)



節間長・葉身長等	組織名	穂長 cm	節間長(cm)							葉身長(cm)			倒伏率 %
			第1節間	第2節間	第3節間	第4節間	第5節間	第6節間	合計	止葉	第2葉	第3葉	
	(農)国広営農	18.2	36.2	17.7	12.4	6.8	1.7	0.4	75.0	21.8	29.2	30.2	0.0
	上原営農組合	18.7	37.9	19.6	14.7	7.2	1.0	0.3	80.6	21.8	27.6	29.3	0.0
	(農)理休営農	18.5	36.8	20.0	14.6	6.1	0.7	0.0	78.3	23.7	29.5	31.2	0.0
	(農)長楽寺営農組合	20.3	39.3	20.7	16.9	8.7	1.2	0.5	87.4	24.3	32.4	33.2	0.0
	高清水農産	19.7	39.8	21.3	14.4	6.3	0.8	0.0	82.5	25.8	32.0	29.9	0.0
	(農)蛇喰営農組合	20.9	41.5	19.4	11.9	6.0	1.7	0.5	81.0	27.1	35.9	34.0	0.0
	R5	18.8	37.6	19.7	13.8	6.4	1.0	0.1	78.6	23.7	30.2	30.4	0.0
	R4	19.3	40.0	22.4	15.2	7.1	0.9	0.0	85.6	22.7	31.8	34.2	0.0
	平年値(R4-H25)	20.0	38.1	21.0	15.2	8.2	1.5	0.1	84.1	23.2	31.2	33.3	0.5



食味・外観品質	組織名	整粒 %	基白 %	腹白 %	乳白 %	青未熟 %	その他未熟 %	胴割粒 %	奇形粒 %	茶米 %	斑点粒 %	玄米蛋白 %	粒型(mm)	
													粒幅	粒長
	(農)国広営農	18.2	0.7	0.5	14.2	0.5	62.8	0.3	0.0	0.3	0.0	7.2	5.21	3.09
	上原営農組合	24.4	1.0	1.4	5.4	1.3	65.1	0.3	0.2	0.0	0.0	6.9	5.30	3.10
	(農)理休営農	32.2	1.0	1.1	10.3	1.0	51.9	0.5	0.3	0.2	0.0	6.9	5.25	3.07
	(農)長楽寺営農組合	20.0	0.8	1.9	12.5	3.7	59.8	0.0	0.1	0.0	0.0	6.9	5.33	3.13
	高清水農産	29.4	1.4	1.5	8.5	0.7	56.3	0.1	0.2	0.0	0.0	6.7	5.31	3.13
	(農)蛇喰営農組合	16.5	1.0	0.8	12.4	5.4	63.3	0.0	0.1	0.0	0.0	6.4	5.37	3.14
	R5	26.6	1.0	1.0	11.0	0.7	57.0	0.3	0.2	0.2	0.0	6.9	5.26	3.10
	R4	21.3	0.4	1.7	70.4	1.5	2.1	0.2	0.0	0.0	0.0	6.8	5.21	3.23
	平年値(R4-H25)	17.8	0.5	2.1	65.4	2.2	4.7	0.3	0.0	0.0	0.1	7.1	5.23	3.23

平均は国広、理休、高清水

令和5年水稻調査結果

成熟期

調査日	組織名	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	R5	5/8	5/19	6/1	6/13	6/22	6/26	7/4	7/24	8/17	
	R4		5/18	5/29	6/13	6/20	6/26	7/10	7/24		
	平年値(R4-H25)		5/21	5/31	6/13	6/21	6/27	7/9	7/23		

草丈 (cm)	組織名	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)いずみ耕房		23.3	36.2		55.3	60.6		98.3		
	あすなろ営農組合		24.5	26.7					99.4		
	R5		23.3	36.2		55.3	60.6		98.3		
	R4		19.3	29.5		45.8	59.9		108.9		
	平年値(R4-H25)		22.3	31.8		56.1	63.3		104.6		

茎数 (本/株)	組織名	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)いずみ耕房	3.0	3.5	10.4		14.5	14.1		11.1	11.1	
	あすなろ営農組合	3.2	2.7	2.1							
	R5	3.0	3.5	10.4		14.5	14.1		11.1	11.1	
	R4	3.0	3.0	5.8		16.5	17.9		12.5	12.5	
	平年値(R4-H25)	3.3	3.4	7.3		17.1	16.6		12.5	12.5	
	目標	3～4		10.2	12.8	18.0				12.8	

茎数 (本/m ²)	組織名	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)いずみ耕房	69	81	241		336	326		257	257	
	あすなろ営農組合	84	71	55							
	R5	69	81	241		336	326		257	257	
	R4	66	66	128		363	393		276	276	
	平年値(R4-H25)	73	76	166		376	374		282	266	
	目標	85		248	310	430				310	






葉齢	組織名	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)いずみ耕房	2.9	5.4	8.1	10.2	11.4	11.8	13.4	13.4		
	あすなろ営農組合	2.8	3.9	6.7	9.0			12.7	14.0		
	R5	2.9	5.4	8.1	10.2	11.4	11.8	13.4	13.4		
	R4	2.3	3.3	6.4	8.6	10.0	11.4		13.8		
	平年値(R4-H25)	2.8	4.7	6.9	9.1	10.5	11.5		13.9		

群落葉色	組織名	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)いずみ耕房			4.3		4.1	4.1	4.3	4.5		
	あすなろ営農組合							4.3	4.7		
	R5			4.3		4.1	4.1	4.3	4.5		
	R4			3.9		4.3	4.2	4.3	4.6		
	平年値(R4-H25)			4.2		4.3	4.3	4.2	4.5		
	目標					3.8	4.2	4.5			

生育時期・田植状況	組織名	田植日	幼穂形成期	～	出穂期	～	成熟期	田植日	基肥量 kg/10a	栽植密度 株/m ²	植付本数	植付深さ cm	苗丈 cm	葉齢	第1葉鞘長 cm
	(農)いずみ耕房	5/3	6/25	20	7/15	33	8/17	5/3	34.0	23.1	3.1	2.7	15.5	2.9	4.3
	あすなろ営農組合	5/5	6/27	21	7/18	33	8/20	5/5	35.0	26.2	3.2	3.2	13.2	2.8	3.3
	R5	5/3	6/25	20	7/15	33	8/17	5/3	34.0	23.1	3.1	2.7	15.5	2.9	4.3
	R4	5/5	6/29	20	7/19	36	8/24	5/5		22.7	3.2	3.0	13.9	2.3	3.3
	平年値(R4-H25)	5/6	6/27	22	7/19	37	8/25	5/6		22.7	3.3	3.5	14.3	2.8	3.5
	目標							5/5		24.2	3～4	3.0	12～13	2.5	3～3.5

移植

雄山錦



平均はいずみ

令和5年水稻調査結果

成熟期

移植



雄山錦

収量調査	組織名	全重	ワラ重	粳重	粗玄米重	精玄米重	屑米重	粳ワラ比	粳すり歩合
		kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a		%
	(農)いずみ耕房	1225	580	607	490	467	23	1.05	76.9
	あすなろ営農組合	1586	732	782	638	606	32	1.07	77.5
	R5	1225	580	607	490	467	23	1.05	76.9
	R4	1269	564	672	551	527	24	1.19	78.4
	平年値(R4-H25)	1409	615	734	603	570	33	1.19	77.7


粒厚分布(%)	組織名	2.5mm以上	2.5～2.4mm	2.4～2.3mm	2.3～2.2mm	2.2～2.1mm	2.1～2.0mm	2.0mm以下	合計	2.1mm以上	
	(農)いずみ耕房	0.3	2.7	20.2	59.9	12.3	2.9	1.7	100.0	95.3	
	あすなろ営農組合	0.7	6.0	30.2	46.6	11.4	3.2	1.9	100.0	94.9	
	R5	0.3	2.7	20.2	59.9	12.3	2.9	1.7	100.0	95.3	
	R4	0.2	6.0	35.9	46.5	7.0	2.1	2.3	100.0	95.6	
	平年値(R4-H25)	0.3	5.0	31.1	45.3	12.6	3.7	2.0	100.0	94.3	

収量構成要素	組織名	㎡当穂数 本/㎡	一穂粒数 粒/穂	㎡当粒数 粒/㎡	登熟歩合 %	千粒重 g	理論収量 kg/10a
	(農)いずみ耕房	257	76	196	91.6	27.3	491
	あすなろ営農組合		71		89.9	27.4	
	R5	257	76	196	91.6	27.3	491
	R4	275	80	221	87.5	30.0	581
目標	平年値(R4-H25)	265	85	240	84.4	28.5	556
	目標	310	75	235	82.0	28.5	550

収量構成要素(目標比)



節間長・葉身長等	組織名	穂長 cm	節間長(cm)							葉身長(cm)			倒伏率 %
			第1節間	第2節間	第3節間	第4節間	第5節間	第6節間	合計	止葉	第2葉	第3葉	
	(農)いずみ耕房	19.1	36.7	19.6	12.7	6.7	0.7	0.0	76.4	28.6	33.7	36.6	0.0
	あすなろ営農組合	17.4	34.4	21.2	16.1	11.0	2.7	0.8	86.2	26.6	34.8	38.5	0.0
	R5	19.1	36.7	19.6	12.7	6.7	0.7	0.0	76.4	28.6	33.7	36.6	0.0
	R4	19.3	37.6	22.6	16.3	9.4	1.7	0.1	87.7	25.0	37.2	41.9	0.0
	平年値(R4-H25)	19.0	35.8	21.7	16.1	10.2	2.6	0.1	86.5	25.8	35.7	40.0	0.0



食味・外観品質	組織名	整粒	基白	腹白	乳白	青未熟	その他未熟	胴割粒	奇形粒	茶米	斑点粒	玄米蛋白	粒型(mm)	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	粒幅	粒長
	(農)いずみ耕房	4.0	0.0	0.0	20.5	0.0	71.9	0.0	0.0	0.2	0.0	6.7	5.49	3.21
	あすなろ営農組合	7.9	0.3	0.3	14.5	0.3	75.0	0.0	0.2	0.4	0.0	6.3	5.51	3.21
	R5	4.0	0.0	0.0	20.5	0.0	71.9	0.0	0.0	0.2	0.0	6.7	5.49	3.21
	R4	3.3	0.1	0.1	83.2	2.1	7.0	0.1	0.0	0.2	0.0	6.6	5.43	3.28
	平年値(R4-H25)	10.5	0.2	0.5	69.8	1.4	9.8	0.5	0.0	0.1	0.2	6.7	5.41	3.27

平均はいずみ

令和5年水稻調査結果

成熟期

移植山田錦

調査日	組織名	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
	R5	5/10	5/19	6/6	6/16	7/4	7/18	7/24	8/8	8/21	9/22
	R4		5/26	6/5				7/24	8/7	8/21	
	平年値(R4-H25)		5/26	6/6	6/16	7/6	7/19	7/26	8/11	8/20	

草丈 (cm)	組織名	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
	(農)信末営農組合		24.9	33.1				92.4		123.4	
	(農)野口営農組合		27.9	30.9							
	(農)次郎丸営農組合		24.0	38.0				86.6		108.4	
	R5		24.5	35.6				89.5		115.9	
	R4		26.4	31.7				83.1		119.6	
	平年値(R4-H25)		22.2	28.6				86.0		118.3	

茎数 (本/株)	組織名	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
	(農)信末営農組合	3.3	3.0	9.5				20.9			18.6
	(農)野口営農組合	4.0	3.5	10.2							
	(農)次郎丸営農組合	3.5	4.9	20.2				30.9		20.8	20.8
	R5	3.4	4.0	14.9				25.9			19.7
	R4	3.9	6.8	16.5				22.5			21.2
	平年値(R4-H25)	3.5	4.2	9.5				21.7			18.5
	目標	3～4		14.8	18.6			20.0			18.6






茎数 (本/m ²)	組織名	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
	(農)信末営農組合	64	58	183				403			358
	(農)野口営農組合	45	39	114							
	(農)次郎丸営農組合	59	82	340				520		350	350
	R5	61	70	262				461			354
	R4	64	121	299				372			348
	平年値(R4-H25)	64	77	180				402			346
	目標	64		270	338			364			338

葉齢	組織名	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
	(農)信末営農組合	2.7	3.6	4.2	9.1	12.2	13.8	14.0		15.4	
	(農)野口営農組合	3.6	3.9	7.7	7.2	10.6	12.7				
	(農)次郎丸営農組合	3.4	5.2	9.2	11.3	12.6	14.1	14.6		15.8	
	R5	3.1	4.4	6.7	10.2	12.4	14.0	14.3		15.6	
	R4	2.4	5.5	7.9				13.9		16.3	
	平年値(R4-H25)	2.7	4.4	6.6	8.6	11.5	12.8	13.4		15.5	

群落葉色	組織名	植付時	田植2週間後	田植1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
	(農)信末営農組合			4.5		4.3	4.1	3.9	4.5	4.5	
	(農)野口営農組合					4.3	4.4				
	(農)次郎丸営農組合			4.4		4.2	4.1	4.1	4.4	4.3	
	R5			4.5		4.3	4.1	4.0	4.5	4.4	
	R4			4.3				4.2	4.3	4.5	
	平年値(R4-H25)			4.3		4.4	4.1	4.0	4.1	4.5	
	目標					4.0		3.8	4.2	4.5	

生育時期・田植状況	組織名	田植日	幼穂形成期	～	出穂期	～	成熟期	田植日	基肥量 kg/10a	栽植密度 株/m ²	植付本数	植付深さ cm	苗丈 cm	葉齢	第1葉鞘長 cm
	(農)信末営農組合	5/6	7/22	19	8/10	42	9/21	5/6	10.0	19.3	3.2	2.9	14.4	2.7	3.8
	(農)野口営農組合	5/18	8/6	20	8/26	36	10/1	5/18	10.0	11.2	4.0	3.0	16.4	3.6	3.6
	(農)次郎丸営農組合	5/1	7/19	20	8/8	43	9/20	5/1	30.0	16.8	3.5	2.9	16.0	3.4	3.2
	R5	5/4	7/21	19	8/9	43	9/21	5/4	20.0	18.1	3.4	2.9	15.2	3.1	3.5
	R4	5/6	7/25	24	8/18	46	10/3	5/6		16.1	4.2	3.2	14.6	2.4	4.1
	平年値(R4-H25)	5/13	7/28	22	8/19	47	10/5	5/13		18.0	3.6	3.6	14.8	2.7	3.7
	目標							5/10		18.2	3～4	3.0	12～13	2.5	3～3.5

平均は信末、次郎丸



令和5年水稻調査結果



成熟期

移植山田錦

収量調査	組織名	全重	ワラ重	籾重	粗玄米重	精玄米重	屑米重	籾ワラ比	籾すり歩合
		kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a		%
	(農)信末営農組合	1899	1081	754	612	494	117	0.70	65.5
	(農)野口営農組合	1965	1080	843	697	623	74	0.78	74.0
	(農)次郎丸営農組合	1676	990	648	526	444	82	0.66	68.5
	R5	1787	1035	701	569	469	99	0.68	67.0
	R4	1452	820	580	477	355	122	0.71	61.0
	平年値(R4-H25)	1630	947	635	524	414	96	0.68	66.7



粒厚分布(%)	組織名	2.5mm以上	2.5～2.4mm	2.4～2.3mm	2.3～2.2mm	2.2～2.1mm	2.1～2.0mm	2.0mm以下	合計	2.0mm以上	2.1mm以上
	(農)信末営農組合	0.0	0.0	3.4	38.7	38.7	12.9	6.2	100.0	93.8	80.8
	(農)野口営農組合	0.0	0.1	4.0	57.8	27.5	7.1	3.5	100.0	96.5	89.4
	(農)次郎丸営農組合	0.0	0.1	6.7	48.5	29.3	9.3	6.3	100.0	93.7	84.5
	R5	0.0	0.0	5.0	43.6	34.0	11.1	6.3	100.0	93.7	82.6
	R4	0.0	0.0	1.9	37.3	34.9	15.9	10.0	100.0	90.0	74.1
	平年値(R4-H25)	0.1	0.2	4.3	38.6	34.3	14.2	8.4	100.0	91.6	77.4

収量調査(平年比)




収量構成要素	組織名	㎡当穂数 本/㎡	一穂粒数 粒/穂	㎡当粒数 粒/㎡	登熟歩合 %	千粒重 g	理論収量 kg/10a
	(農)信末営農組合	358	69	249	66.4	27.2	450
	(農)野口営農組合		62		66.2	29.0	
	(農)次郎丸営農組合	350	63	220	67.1	27.4	408
	R5	354	66	234	66.8	27.3	429
	R4	348	59	202	59.9	28.0	334
	平年値(R4-H25)	346	62	213	62.0	28.2	370
	目標	338	55	186	75.0	28.5	400

収量構成要素(目標比)



節間長・葉身長等	組織名	穂長	節間長(cm)							葉身長(cm)			倒伏率
		cm	第1節間	第2節間	第3節間	第4節間	第5節間	第6節間	合計	止葉	第2葉	第3葉	%
	(農)信末営農組合	20.6	46.1	24.0	15.9	9.9	6.6	1.0	103.5				0.0
	(農)野口営農組合	19.6	46.1	23.9	15.4	9.9	5.0	1.0	101.3				0.0
	(農)次郎丸営農組合	20.5	43.2	22.5	14.3	10.2	5.5	0.7	96.3	24.6	37.8	46.5	0.0
	R5	20.5	44.7	23.3	15.1	10.0	6.0	0.8	99.9	24.6	37.8	46.5	0.0
	R4	19.6	42.5	24.9	17.4	10.6	6.6	2.4	104.4				0.0
平年値(R4-H25)	19.7	43.0	25.2	18.1	11.2	6.6	1.3	105.4	25.2	38.1	47.3	0.8	



食味・外観品質	組織名	整粒 %	基白 %	腹白 %	乳白 %	青未熟 %	その他未熟 %	胴割粒 %	奇形粒 %	茶米 %	斑点粒 %	玄米蛋白 %	粒型(mm)	
													粒幅	粒長
	(農)信末営農組合	37.4	1.2	6.6	31.4	0.0	16.9	4.1	0.1	0.0	0.7	6.3	5.44	3.23
	(農)野口営農組合	58.2	1.8	4.6	24.1	0.0	10.0	1.1	0.0	0.0	0.1	5.5	5.54	3.25
	(農)次郎丸営農組合	38.9	2.2	3.9	38.4	0.0	12.5	3.1	0.0	0.2	0.1	6.0	5.41	3.23
	R5	38.2	1.7	5.3	34.9	0.0	14.7	3.6	0.1	0.1	0.4	6.2	5.43	3.23
	R4	48.7	1.3	3.3	24.2	5.2	14.1	1.6	0.2	0.3	0.7	6.5	5.46	3.28
	平年値(R4-H25)	48.4	0.9	2.6	22.6	2.6	14.8	2.8	0.1	0.3	0.6	6.4	5.52	3.27

平均は信末、次郎丸

令和5年水稻調査結果

成熟期

カルパー

山田錦

調査日	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	R5	5/29	6/4	6/19	7/3	7/18	7/31	8/17	8/30	9/21	
	R4	5/27	6/5				7/31	8/17	8/25		
	平年値(R4-H25)	5/26	6/9	6/18	7/8	7/17	7/30	8/15	8/25		

草丈（cm）	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農) 吉松営農組合	23.1	29.6				85.5		110.6		
	R5	23.1	29.6				85.5		110.6		
	R4	20.0	25.3				90.6		129.9		
	平年値(R4-H25)	20.5	28.1				86.2		119.5		






茎数（本／m）	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農) 吉松営農組合	26	94				114			105	
	R5	26	94				114			105	
	R4	28	111				133			128	
	平年値(R4-H25)	23	80				133			109	
	目標	18	82		151		109			102	

茎数（本／m ² ）	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農) 吉松営農組合	87	313				380			350	
	R5	87	313				380			350	
	R4	93	370				443			427	
	平年値(R4-H25)	75	266				444			359	
	目標	60	270		500		364			338	

葉齢	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農) 吉松営農組合	4.5	6.2	8.4	10.2	11.4	12.8		14.4		
	R5	4.5	6.2	8.4	10.2	11.4	12.8		14.4		
	R4	4.0	6.2				12.5		14.2		
	平年値(R4-H25)	3.5	6.3	8.4	10.8	11.6	12.6		14.4		

群落葉色	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農) 吉松営農組合		4.4		4.2	4.1	4.0	4.3	4.3		
	R5		4.4		4.2	4.1	4.0	4.3	4.3		
	R4		4.5				4.2	4.2	4.5		
	平年値(R4-H25)		4.3		4.0	3.9	4.0	4.2	4.5		
	目標					4.0	3.8	4.2	4.5		

生育時期・播種状況	組織名	播種日	幼穂形成期	～	出穂期	～	成熟期	播種日	基肥量 kg/10a	播種量 kg/10a	播種深度 mm	苗立本数 本/m ²	苗立率 %	
	(農) 吉松営農組合	5/2	7/31	19	8/19	40	9/28	5/2	18.0	3.1	24.0	81.3	84.2	
	R5	5/2	7/31	19	8/19	40	9/28	5/2	18.0	3.1	24.0	81.3	84.2	
	R4	5/3	8/1	23	8/24	45	10/8	5/3		3.1	8.4	79.3	82.1	
	平年値(R4-H25)	5/3	8/1	21	8/22	48	10/9	5/3		3.0	7.5	61.6	60.2	
	目標							4/30		3.7	10.0	60.0	50～80	



令和5年水稻調査結果

成熟期

カルパー



山田錦

収量調査	組織名	全重	ワラ重	粳重	粗玄米重	精玄米重	屑米重	粳ワラ比	粳すり歩合
		kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a		%
	(農)吉松営農組合	1408	880	493	398	302	95	0.56	61.4
	R5	1408	880	493	398	302	95	0.56	61.4
	R4	1655	950	638	541	379	162	0.67	59.4
	平年値(R4-H25)	1507	904	589	491	379	111	0.65	64.3


粒厚分布(%)	組織名	2.5mm以上	2.5～2.4mm	2.4～2.3mm	2.3～2.2mm	2.2～2.1mm	2.1～2.0mm	2.0mm以下	合計	2.0mm以上	2.1mm以上
	(農)吉松営農組合	0.0	0.0	0.9	35.3	40.0	15.5	8.4	100.0	91.6	76.1
	R5	0.0	0.0	0.9	35.3	40.0	15.5	8.4	100.0	91.6	76.1
	R4	0.0	0.0	1.5	31.4	37.1	16.7	6.7	93.4	86.7	70.0
	平年値(R4-H25)	0.0	0.3	6.0	34.4	36.5	16.1	6.7	100.0	93.3	77.3

収量構成要素	組織名	㎡当穂数 本/㎡	一穂粳数 粒/穂	㎡当粳数 粒/㎡	登熟歩合 %	千粒重 g	理論収量 kg/10a
	(農)吉松営農組合	350	48	168	54.8	27.2	273
	R5	350	48	168	54.8	27.2	273
	R4	429	56	241	52.5	28.8	365
	平年値(R4-H25)	360	58	206	59.2	28.4	343
	目標	338	55	186	67.0	29.0	360

収量構成要素(目標比)



節間長・葉身長等	組織名	穂長 cm	節間長(cm)							葉身長(cm)			倒伏率 %
			第1節間	第2節間	第3節間	第4節間	第5節間	第6節間	合計	止葉	第2葉	第3葉	
	(農)吉松営農組合	19.0	46.1	21.8	12.5	8.6	5.6	1.0	95.5	23.4	37.5	48.6	0.0
	R5	19.0	46.1	21.8	12.5	8.6	5.6	1.0	95.5	23.4	37.5	48.6	0.0
	R4	19.8	44.5	27.1	18.4	10.0	5.9	1.0	106.9	26.9	37.8	49.2	
	平年値(R4-H25)	19.4	43.4	25.4	17.0	10.4	5.6	1.1	103.0	25.2	38.8	48.0	



食味・外観品質	組織名	整粒 %	基白 %	腹白 %	乳白 %	青未熟 %	その他未熟 %	胴割粒 %	奇形粒 %	茶米 %	斑点粒 %	玄米蛋白 %	粒型(mm)	
													粒幅	粒長
	(農)吉松営農組合	26.7	1.6	2.1	53.7	0.1	12.7	0.7	0.0	0.0	0.4	6.4	5.42	3.26
	R5	26.7	1.6	2.1	53.7	0.1	12.7	0.7	0.0	0.0	0.4	6.4	5.42	3.26
	R4	37.5	1.5	4.2	28.0	17.7	9.7	0.6	0.0	0.1	0.3	6.9	5.60	3.27
	平年値(R4-H25)	40.0	1.7	3.0	24.8	6.5	17.0	1.5	0.0	0.1	1.0	6.2	5.53	3.27


令和5年水稻調査結果

成熟期


鉄コ 山田錦

調査日	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	R5	6/7	6/19	6/19	7/3	7/18	7/31	8/17	8/30	9/21	
	R4	5/27	6/5				7/31	8/17	8/26		
	平年値(R4-H25)	5/26	6/7	6/18	7/8	7/17	7/30	8/15	8/26		


草丈（cm）	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)いけのしり営農	16.3	16.3				65.9		103.4		
	R5	16.3	16.3				65.9		103.4		
	R4	16.0	20.3				98.4		133.0		
	平年値(R4-H25)	12.5	25.3				87.5		118.2		




茎数（本／m）	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)いけのしり営農	30	30				106			96	
	R5	30	30				106			96	
	R4	20	45				119			113	
	平年値(R4-H25)	19	55				122			100	
	目標	18	82		151		109			102	




茎数（本／m²）	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)いけのしり営農	100	100				353			320	
	R5	100	100				353			320	
	R4	67	150				397			377	
	平年値(R4-H25)	65	183				405			326	
	目標	60	270		500		364			338	



葉齢	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)いけのしり営農	3.5	3.5	5.5	8.4	9.9	11.2		13.6		
	R5	3.5	3.5	5.5	8.4	9.9	11.2		13.6		
	R4	2.8	5.8				14.1		16.0		
	平年値(R4-H25)	2.9	5.9	8.6	11.1	12.0	13.0		14.9		



群落葉色	組織名	苗立期	播種1ヵ月後	6月中旬	7月上旬	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	
	(農)いけのしり営農		4.2		4.3	4.0	4.1	4.3	4.2		
	R5		4.2		4.3	4.0	4.1	4.3	4.2		
	R4		4.2				4.3	4.3	4.6		
	平年値(R4-H25)		4.2		4.5	4.3	4.1	4.2	4.6		
	目標					4.0	3.8	4.2	4.5		



生育時期・播種状況	組織名	播種日	幼穂形成期	～	出穂期	～	成熟期	播種日	基肥量 kg/10a	播種量 kg/10a	播種深度 mm	苗立本数 本/m²	苗立率 %	
	(農)いけのしり営農	5/14	8/3	27	8/30	40	10/9	5/14	20.0	4.5	0.0	100.0	71.3	
	R5	5/14	8/3	27	8/30	40	10/9	5/14	20.0	4.5	0.0	100.0	71.3	
	R4	5/3	8/3	24	8/27	50	10/16	5/3		3.7	0.6	55.6	48.2	
	平年値(R4-H25)	5/4	8/2	23	8/25	48	10/12	5/4		3.7	0.7	61.5	53.0	
	目標							4/30		4.2	0.0	60.0	50～80	


令和5年水稻調査結果

成熟期


鉄コ 山田錦

収量調査	組織名	全重	ワラ重	粳重	粗玄米重	精玄米重	屑米重	粳ワラ比	粳すり歩合
		kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a		%
	(農)いけのしり営農	1296	736	530	434	300	133	0.72	56.7
	R5	1296	736	530	434	300	133	0.72	56.7
	R4	1788	1017	682	561	339	222	0.67	49.8
	平年値(R4-H25)	1633	1001	594	480	345	136	0.60	58.7

収量調査(平年比)





粒厚分布(%)	組織名	2.5mm以上	2.5～2.4mm	2.4～2.3mm	2.3～2.2mm	2.2～2.1mm	2.1～2.0mm	2.0mm以下	合計	2.0mm以上	2.1mm以上
	(農)いけのしり営農	0.0	0.0	1.0	24.6	43.7	18.0	12.7	100.0	87.3	69.3
	R5	0.0	0.0	1.0	24.6	43.7	18.0	12.7	100.0	87.3	69.3
	R4	0.0	0.0	0.6	21.4	38.5	21.9	10.0	92.4	82.4	60.5
	平年値(R4-H25)	0.0	0.3	3.3	31.6	36.2	18.3	8.1	100.0	89.7	71.4




収量構成要素	組織名	㎡当穂数 本/㎡	一穂粒数 粒/穂	㎡当粒数 粒/㎡	登熟歩合 %	千粒重 g	理論収量 kg/10a
	(農)いけのしり営農	320	63	201	40.2	27.9	240
	R5	320	63	201	40.2	27.9	240
	R4	377	60	227	40.2	27.8	254
	平年値(R4-H25)	325	58	189	54.8	28.0	289
	目標	338	55	186	67.0	29.0	360

収量構成要素(目標比)



節間長・葉身長等	組織名	穂長 cm	節間長 (cm)							葉身長 (cm)			倒伏率 %
			第1節間	第2節間	第3節間	第4節間	第5節間	第6節間	合計	止葉	第2葉	第3葉	
	(農)いけのしり営農	19.8	44.1	25.3	12.6	7.9	4.1	1.0	95.0	31.1	39.5	40.4	0.0
	R5	19.8	44.1	25.3	12.6	7.9	4.1	1.0	95.0	31.1	39.5	40.4	0.0
	R4	19.4	42.4	25.8	21.4	12.3	7.2	2.3	111.4	27.4	40.6	52.0	
	平年値(R4-H25)	19.1	42.5	24.5	16.9	10.2	5.9	1.1	101.2	24.6	38.2	46.8	



食味・外観品質	組織名	整粒 %	基白 %	腹白 %	乳白 %	青未熟 %	その他未熟 %	胴割粒 %	奇形粒 %	茶米 %	斑点粒 %	玄米蛋白 %	粒型 (mm)	
													粒幅	粒長
	(農)いけのしり営農	63.0	0.7	2.4	20.3	0.5	11.1	1.7	0.0	0.1	0.2	6.1	5.49	3.25
	R5	63.0	0.7	2.4	20.3	0.5	11.1	1.7	0.0	0.1	0.2	6.1	5.49	3.25
	R4	41.9	1.4	4.7	31.1	9.1	10.3	0.6	0.1	0.1	0.3	6.4	5.53	3.29
	平年値(R4-H25)	50.5	0.9	2.2	21.0	3.5	16.1	1.0	0.1	0.4	0.4	6.3	5.50	3.25